

Criterios de PA

Grupo de autorización previa	ABILIFY ASIMTUFII
Nombres del medicamento	ABILIFY ASIMTUFII
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Se ha establecido la tolerabilidad con aripiprazol oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ABILIFY MYCITE
Nombres del medicamento	ABILIFY MYCITE MAINTENANC, ABILIFY MYCITE STARTER KI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la esquizofrenia: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, lurasidona, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona, Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos de marca: Caplyta, Rexulti, Secuado, Vraylar. Para el tratamiento agudo de episodios maníacos o mixtos asociados al trastorno bipolar I: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona, Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a la marca Vraylar. Para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar I: El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona. Para el tratamiento complementario del trastorno depresivo mayor (MDD): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, olanzapina, quetiapina, Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene contraindicado uno de los siguientes productos de marca. Rexulti, Vraylar.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ABIRATERONE
Nombres del medicamento	ABIRATERONE ACETATE, ZYTIGA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de próstata con ganglios positivos (N1), no metastásico (M0) y cáncer de próstata de muy alto riesgo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ACITRETIN
Nombres del medicamento	ACITRETIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Prevención de cánceres de piel no melanoma en individuos de alto riesgo, liquen plano, queratosis folicular (enfermedad de Darier)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Psoriasis: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al metotrexato o la ciclosporina.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ACTIMMUNE
Nombres del medicamento	ACTIMMUNE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Micosis fungoide, síndrome de Sezary.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ADAKVEO
Nombres del medicamento	ADAKVEO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 16 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	ADAPALENE
Nombres del medicamento	ADAPALENE, DIFFERIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ADBRY
Nombres del medicamento	ADBRY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para dermatitis atópica, tratamiento inicial: 1) el paciente tiene una enfermedad de moderada a grave, Y 2) el paciente ha tenido una respuesta inadecuada al tratamiento con un corticosteroide tópico o un inhibidor tópico de la calcineurina O los corticosteroides tópicos y los inhibidores tópicos de la calcineurina no son aconsejables para el paciente. En caso de dermatitis atópica, continuación del tratamiento: el paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 4 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ACTIMMUNE
Nombres del medicamento	ADEMPAS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood. En caso de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (CTEPH) (Grupo 4 de la OMS): 1) El paciente presenta CTEPH persistente o recurrente tras una endarterectomía pulmonar (PEA), O 2) El paciente presenta CTEPH inoperable con diagnóstico confirmado mediante cateterismo cardíaco derecho Y mediante tomografía computarizada (CT), resonancia magnética (MRI) o angiografía pulmonar.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ADLARITY
Nombres del medicamento	ADLARITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Demencia vascular
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente es incapaz de tomar formas de dosificación oral (por ejemplo, dificultad para tragar comprimidos o cápsulas). Para demencia de tipo Alzheimer: el paciente ha respondido inadecuadamente, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para el parche transdérmico de rivastigmina.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ADZYNMA
Nombres del medicamento	ADZYNMA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de púrpura trombocitopénica trombótica congénita (cTTP), tratamiento inicial: El diagnóstico se confirmó mediante pruebas genéticas o ensayo enzimático con mutaciones bialélicas en el gen ADAMTS13. Para cTTP, continuación: El paciente está respondiendo a la terapia.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AIMOVIG
Nombres del medicamento	AIMOVIG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento preventivo de la migraña, inicial: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento en una prueba de 4 semanas de cualquiera de los siguientes: medicamentos antiepilépticos (AED), agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos O 2) El paciente experimentó una intolerancia o tiene una contraindicación que le impediría probar durante 4 semanas cualquiera de los siguientes: medicamentos antiepilépticos (AED), agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos. Para el tratamiento preventivo de la migraña, continuación: El paciente recibió al menos 3 meses de tratamiento con el medicamento solicitado, y el paciente tuvo una reducción de los días de migraña al mes desde el inicio.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 3 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AKEEGA
Nombres del medicamento	AKEEGA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AKLIEF
Nombres del medicamento	AKLIEF
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 9 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ALBENDAZOLE
Nombres del medicamento	ALBENDAZOLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Ascariasis, tricuriasis, microsporidiosis
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Hidatidosis, Microsporidiosis: 6 meses, Todas las demás indicaciones: 1 mes
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ALDURAZYME
Nombres del medicamento	ALDURAZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para mucopolisacaridosis I (MPS I): El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática alfa-L-iduronidasa y/o mediante pruebas genéticas. Los pacientes con la forma Scheie (es decir, MPS I atenuada) deben tener síntomas de moderados a graves.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ALECENSA
Nombres del medicamento	ALECENSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) ALK-positivo recidivante, metástasis cerebrales de NSCLC ALK-positivo, linfoma anaplásico de células grandes ALK-positivo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC): la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ALIQOPA
Nombres del medicamento	ALIQOPA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma de la zona marginal extraganglionar (EMZL) del estómago, EMZL de localizaciones no gástricas (no cutáneas), linfoma de la zona marginal ganglionar, linfoma de la zona marginal esplénica
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para linfoma folicular, linfoma de la zona marginal extraganglionar (EMZL) del estómago, EMZL de sitios no gástricos (no cutáneos), linfoma de la zona marginal ganglionar y linfoma de la zona marginal esplénica: 1) la enfermedad es recidivante o refractaria Y 2) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior tras al menos 2 tratamientos previas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ALKINDI
Nombres del medicamento	ALKINDI SPRINKLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para caso de insuficiencia corticosuprarrenal: 1) El paciente necesita una concentración que no está disponible en comprimidos de hidrocortisona (por ejemplo, 0,5 mg, 1 mg o 2 mg) O 2) El paciente tiene dificultad para tragar los comprimidos de hidrocortisona.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ALOSETRON
Nombres del medicamento	ALOSETRON HYDROCHLORIDE, LOTRONEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el síndrome de colon irritable (IBS) con diarrea severa predominante: 1) El medicamento solicitado se receta a una mujer biológica o a una persona que se autoidentifica como mujer, 2) síntomas crónicos de SII que duran al menos 6 meses, 3) se han descartado anomalías del tubo digestivo, Y 4) respuesta inadecuada a un tratamiento convencional (por ejemplo, antiespasmódicos, antidepresivos, antidiarreicos).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	INHIBIDOR DE LA PROTEINASA ALFA1
Nombres del medicamento	ARALAST NP, GLASSIA, PROLASTIN-C, ZEMAIRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información Médica Requerida	En caso de deficiencia de inhibidor de proteinasa alfa1: El paciente debe tener 1) enfisema clínicamente evidente, Y 2) nivel de inhibidor de la proteinasa alfa1 en suero antes del tratamiento inferior a 11 micromol/L (80 mg/dL por inmunodifusión radial o 50 mg/dL por nefelometría).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ALPRAZOLAM ER
Nombres del medicamento	ALPRAZOLAM ER, XANAX XR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para caso de trastornos de pánico: 1) El medicamento solicitado se está utilizando simultáneamente con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (SSRI) o un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI) hasta que el SSRI/SNRI sea eficaz para los síntomas del trastorno de pánico, O el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para AL MENOS DOS agentes de las siguientes clases: a) inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), o b) inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI) Y 2) El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con este medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente (Nota: La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente monitorizado).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	4 meses
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores.
Grupo de autorización previa	ALUNBRIG
Nombres del medicamento	ALUNBRIG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente anaplásico linfoma quinasa (ALK)-positivo, metástasis cerebrales de NSCLC ALK-positivo, tumores miofibroblásticos inflamatorios (IMT) con translocación ALK.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC): 1) la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica Y 2) la enfermedad es positiva para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AMBRISANTAN
Nombres del medicamento	AMBRISANTAN, LETAIRIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ANFETAMINAS
Nombres del medicamento	ADDERALL, ADDERALL XR, ADZENYS XR-ODT, AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETA, DEXEDRINE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE, DYANAVEL XR, MYDAYIS, XELSTRYM, ZENZEDI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información Médica Requerida	1) El paciente tiene un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD) o Trastorno por Déficit de Atención (ADD) O 2) El paciente tiene un diagnóstico de narcolepsia confirmado por un estudio del sueño.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AMVUTTRA
Nombres del medicamento	AMVUTTRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la polineuropatía de amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina, tratamiento inicial: el paciente es positivo para una mutación del gen TTR y presenta una manifestación clínica de la enfermedad. En caso de polineuropatía de amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina, continuación del tratamiento: el paciente demuestra una respuesta beneficiosa al tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	AMZEEQ
Nombres del medicamento	AMZEEQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 9 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ARANESP
Nombres del medicamento	ARANESP ALBUMIN FREE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Anemia en pacientes con síndromes mielodisplásicos (MDS)
Criterios de exclusión	Pacientes que reciben quimioterapia con intención curativa. Pacientes con cáncer mieloide.
Información médica requerida	Los requisitos relativos a los valores de hemoglobina (Hgb) excluyen los valores debidos a una transfusión reciente. En caso de aprobación inicial: 1) En caso de anemia debida a enfermedad renal crónica (ERC): el paciente tiene reservas adecuadas de hierro (por ejemplo, una saturación de transferrina [TSAT] mayor o igual al 20%), Y 2) Para todos los usos: la hemoglobina (Hgb) pretratamiento (sin tratamiento con eritropoyetina en el mes anterior) es inferior a 10 g/dL, Y 3) En caso de anemia en pacientes con síndrome mielodisplásico (MDS): el nivel de eritropoyetina sérica (EPO) pretratamiento es igual o inferior a 500 unidades internacionales/L. Para reautorizaciones (el paciente recibió tratamiento con eritropoyetina en el mes anterior) en todos los usos: 1) El paciente ha recibido al menos 12 semanas de tratamiento con eritropoyetina, Y 2) El paciente ha respondido al tratamiento con eritropoyetina, Y 3) La Hgb actual es inferior a 12 g/dL, Y 4) En caso de CKD: el paciente tiene reservas de hierro adecuadas (por ejemplo, una saturación de transferrina [TSAT] superior o igual al 20%).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	16 semanas
Otros criterios	Se denegará la cobertura en virtud de la Parte D si la cobertura está disponible en virtud de la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento es recetado y dispensado o administrado para el individuo (por ejemplo, utilizado para el tratamiento de anemia de un paciente con insuficiencia renal crónica que se somete a diálisis, o suministrado por un médico como parte de un servicio médico).
Grupo de autorización previa	ARAZLO
Nombres del medicamento	ARAZLO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 9 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ARCALYST
Nombres del medicamento	ARCALYST
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Prevención de los ataques de gota en pacientes que inician o continúan un tratamiento reductor del ácido úrico.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la prevención de ataques de gota en pacientes que inician o continúan un tratamiento reductor del ácido úrico (por ejemplo, alopurinol) (nuevos comienzos): 1) dos o más ataques de gota en los 12 meses anteriores, Y 2) respuesta inadecuada, intolerancia o tiene una contraindicación a las dosis máximas toleradas de un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) y colchicina, Y 3) uso concomitante con tratamiento reductor del ácido úrico. En caso de prevención de ataques de gota en pacientes que inician o continúan un tratamiento reductor del ácido úrico (por ejemplo, alopurinol) (continuación): 1) el paciente debe haber logrado o mantenido un beneficio clínico (es decir, un menor número de crisis de gota o menos días de brote) en comparación con el valor inicial, Y 2) uso continuado de un tratamiento reductor del ácido úrico simultáneamente con el documento solicitado. En caso de pericarditis recurrente: el paciente debe haber tenido una respuesta inadecuada, intolerancia o tiene una contraindicación a las dosis máximas toleradas de un NSAID y colchicina.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ARIKAYCE
Nombres del medicamento	ARIKAYCE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ARMODAFINIL
Nombres del medicamento	ARMODAFINIL, NUVIGIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de somnolencia excesiva asociada a la narcolepsia: El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño. En caso de somnolencia excesiva asociada a la apnea obstructiva del sueño (AOS): El diagnóstico se ha confirmado mediante polisomnografía.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ASPARLAS
Nombres del medicamento	ASPARLAS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-El paciente tiene 21 años de edad o menos
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ASPRUZYO
Nombres del medicamento	ASPRUZYO SPRINKLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de angina crónica: 1) El paciente ha probado los comprimidos de ranolazina O 2) El paciente no puede tomar los comprimidos de ranolazina por cualquier motivo (por ejemplo, dificultad para tragar los comprimidos, requiere administración nasogástrica).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AUBAGIO
Nombres del medicamento	AUBAGIO, TERIFLUNOMIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	AUGTYRO
Nombres del medicamento	AUGTYRO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	AUSTEDO
Nombres del medicamento	AUSTEDO, AUSTEDO XR, AUSTEDO XR PATIENT TITRAT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Síndrome de Tourette
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AUVELITY
Nombres del medicamento	AUVELITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el trastorno depresivo mayor (MDD): El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes: inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), mirtazapina, bupropión.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	AVEED
Nombres del medicamento	AVEED
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En el caso de la disforia de género, el paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AVONEX
Nombres del medicamento	AVONEX, AVONEX PEN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para formas recidivantes de esclerosis múltiple (MS) y síndrome clínicamente aislado: el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a Betaseron.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	AVSOLA
Nombres del medicamento	AVSOLA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Síndrome de Behçet, hidradenitis supurativa, artritis idiopática juvenil, pioderma gangrenoso, sarcoidosis, arteritis de Takayasu, uveítis.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes criterios: a) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con metotrexato (MTX) o leflunomida O b) intolerancia o tiene una contraindicación a MTX Y leflunomida, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) respuesta inadecuada, intolerancia o tiene una contraindicación a MTX O b) respuesta inadecuada o intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. En caso de espondilitis anquilosante activa (sólo en nuevos tratamientos): respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) O contraindicación que prohíba probar con NSAID. En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente o intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% del BSA o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	En caso de hidradenitis supurativa (sólo para nuevos tratamientos): El paciente tiene una enfermedad grave y refractaria. En caso de uveítis (sólo para nuevos tratamientos): Respuesta inadecuada o intolerancia o tiene una CI a una prueba de tratamiento inmunosupresor para la uveítis. Para las indicaciones aprobadas por la FDA y los usos fuera de los indicados en la etiqueta que se solapan: El paciente presentó una reacción adversa intolerable a Renflexis y dicha reacción adversa NO se atribuyó al principio activo tal y como se describe en la información de la receta.

Grupo de autorización previa	AYVAKIT
Nombres del medicamento	AYVAKIT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Neoplasias mieloides y linfoides con eosinofilia, tumor del estroma gastrointestinal (GIST) para enfermedad irreseccable, recurrente o metastásica sin mutación del exón 18 del receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRA).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para las neoplasias mieloides y linfoides con eosinofilia, el paciente cumple todos los criterios siguientes: 1) La enfermedad es positiva al reordenamiento FIP1L1- PDGFRA, Y 2) La enfermedad alberga una mutación PDGFRA D842A, Y 3) La enfermedad es resistente al imatinib. Para GIST, el paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) La enfermedad alberga la mutación del exón 18 del PDGFRA, incluidas las mutaciones D842V del PDGFRA, O 2) El medicamento solicitado se utilizará tras el fracaso de por lo menos dos tratamientos aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en la enfermedad irreseccable, recurrente o metastásica sin mutación del exón 18 del PDGFRA. Para mastocitosis sistémica: 1) El paciente tiene un diagnóstico de mastocitosis sistémica avanzada indolente (lo que incluye mastocitosis sistémica agresiva (ASM), mastocitosis sistémica con neoplasia hematológica asociada (SM-AHN) y leucemia mastocitaria (MCL) Y 2) El paciente tiene un recuento de plaquetas mayor o igual a 50,000/microlitro (mCL).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	AZSTARYS
Nombres del medicamento	AZSTARYS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente cumple los dos criterios siguientes: 1) El paciente tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) o trastorno por déficit de atención (ADD) Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un producto genérico de anfetamina o a un producto genérico de metilfenidato.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa
Nombres del medicamento

B VS. D

ABELCET, ABRAXANE, ACETYLCYSTEINE, ACYCLOVIR SODIUM, AKYNZEO, ALBUTEROL SULFATE, AMBISOME, AMPHOTERICIN B, AMPHOTERICIN B LIPOSOME, APREPITANT, ARFORMOTEROL TARTRATE, ARZERRA, ASTAGRAF XL, ATGAM, AZACITIDINE, AZASAN, AZATHIOPRINE, BENDAMUSTINE HYDROCHLORID, BENDEKA, BLEOMYCIN SULFATE, BROVANA, BUDESONIDE, CALCITONIN-SALMON, CALCITRIOL, CARBOPLATIN, CARNITOR, CELLCEPT, CINACALCET HYDROCHLORIDE, CISPLATIN, CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 1, CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5, CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15%, CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20%, CLINIMIX 6/5, CLINIMIX 8/10, CLINIMIX 8/14, CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE, CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE, CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15, CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20, CLINIMIX E 8/10, CLINIMIX E 8/14, CLINISOL SF 15%, CLINOLIPID, CROMOLYN SODIUM, CYCLOPHOSPHAMIDE, CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDR, CYCLOSPORINE, CYCLOSPORINE MODIFIED, CYTARABINE, CYTARABINE AQUEOUS, DACARBAZINE, DECITABINE, DEPO-MEDROL, DEXAMETHASONE, DEXAMETHASONE INTENSOL, DEXRAZOXANE, DEXTROSE 50%, DEXTROSE 70%, DILAUDID, DIPHTHERIA/TETANUS TOXOID, DOCETAXEL, DOXERCALCIFEROL, DOXIL, DOXORUBICIN HCL, DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE, DRONABINOL, DUOPA, ELITEK, ELLENCE, EMEND, EMEND TRIPACK, ENGERIX-B, ENVARUSUS XR, EPOPROSTENOL SODIUM, ERBITUX, ETOPOPHOS, ETOPOSIDE, EVEROLIMUS, FASLODEX, FIASP PUMPCART, FLOLAN, FLUDARABINE PHOSPHATE, FLUOROURACIL, FORMOTEROL FUMARATE, FOSCARNET SODIUM, FULVESTRANT, GAMASTAN, GANCICLOVIR, GEMCITABINE HCL, GEMCITABINE HYDROCHLORIDE, GENGRAF, GRANISETRON HYDROCHLORIDE, HALAVEN, HEPARIN SODIUM, HEPLISAV-B, HUMULIN R U-500 (CONCENTR, HYDROMORPHONE HCL, HYDROMORPHONE HYDROCHLORI, HYDROXYPROGESTERONE CAPRO, IBANDRONATE SODIUM, IFEX, IFOSFAMIDE, IMOVAX RABIES (H.D.C.V.), IMURAN, INTRALIPID, IPRATROPIUM BROMIDE, IPRATROPIUM BROMIDE/ALBUT, IRINOTECAN, IRINOTECAN HYDROCHLORIDE, IXEMPRA KIT, JYNNEOS, KADCYLA, KENALOG-10, KENALOG-40, KENALOG-80, KHAPZORY, LEUCOVORIN CALCIUM, LEVALBUTEROL, LEVALBUTEROL HCL, LEVALBUTEROL HYDROCHLORID, LEVOCARNITINE, LEVOLEUCOVORIN, LEVOLEUCOVORIN CALCIUM, LIDOCAINE HCL, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE, LIDOCAINE/PRILOCAINE, MARINOL, MEDROL, METHOTREXATE, METHOTREXATE SODIUM, METHYLPREDNISOLONE, METHYLPREDNISOLONE ACETAT, METHYLPREDNISOLONE SODIUM, MITOMYCIN, MITOXANTRONE HCL, MORPHINE SULFATE, MORPHINE SULFATE/SODIUM C, MYCOPHENOLATE MOFETIL, MYCOPHENOLIC ACID DR, MYFORTIC, NEBUPENT, NEORAL, NIPENT, NULOJIX, NUTRILIPID, ONDANSETRON HCL, ONDANSETRON HYDROCHLORIDE, ONDANSETRON ODT, ONIVYDE, OXALIPLATIN, PACLITAXEL, PACLITAXEL PROTEIN-BOUND, PAMIDRONATE DISODIUM, PARAPLATIN, PARICALCITOL,

PEDIAPRED, PEMETREXED, PENTAMIDINE ISETHIONATE, PERFOROMIST, PLENAMINE, PREDNISOLONE, PREDNISOLONE SODIUM PHOSP, PREDNISON, PREDNISON INTENSOL, PREHEVBRI, PREMASOL, PROGRAF, PROSOL, PULMICORT, RABAERT, RAPAMUNE, RECLAST, RECOMBIVAX HB, ROCALTROL, SANDIMMUNE, SENSIPAR, SIROLIMUS, SMOFLIPID, SOLU-MEDROL, SYNDROS, TACROLIMUS, TDVAX, TEMSIROLIMUS, TENIVAC, TOPOTECAN HCL, TOPOTECAN HYDROCHLORIDE, TORISEL, TPN ELECTROLYTES, TRAVASOL, TREANDA, TREXALL, TRIAMCINOLONE ACETONIDE, TROPHAMINE, VALRUBICIN, VALSTAR, VARUBI, VECTIBIX, VELETRI, VIDAZA, VINBLASTINE SULFATE, VINCISTINE SULFATE, VINOELBINE TARTRATE, XATMEP, XYLOCAINE, XYLOCAINE-MPF, ZEMPLAR, ZILRETTA, ZOLEDRONIC ACID, ZORTRESS

Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	N/ Ä
Otros criterios	Este medicamento podría estar cubierto bajo la Parte B o D de Medicare, dependiendo de las circunstancias. Podría ser necesario enviar información describiendo el uso y entorno del medicamento para tomar la decisión.
Grupo de autorización previa	BACLOFEN
Nombres del medicamento	BACLOFEN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente es incapaz de tomar formas sólidas de dosificación oral (por ejemplo, dificultad para tragar comprimidos o cápsulas, necesita su administración mediante una sonda de alimentación).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BAFIERTAM
Nombres del medicamento	BAFIERTAM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BALVERSA
Nombres del medicamento	BALVERSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma urotelial: 1) la enfermedad presenta alteraciones genéticas susceptibles del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR3) o del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR2) Y 2) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior para cualquiera de los siguientes casos: a) carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico, b) carcinoma primario recurrente de la uretra, c) carcinoma urotelial de vejiga en estadios II-IV, d) carcinoma urotelial de vejiga con recurrencia metastásica o local tras cistectomía, o e) carcinoma urotelial de vejiga con recurrencia local invasiva muscular o enfermedad persistente en una vejiga preservada.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BANZEL
Nombres del medicamento	BANZEL, RUFINAMIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 año de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BAVENCIO
Nombres del medicamento	BAVENCIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Neoplasia trofoblástica gestacional, carcinoma endometrial
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el carcinoma urotelial, el medicamento solicitado se utilizará como cualquiera de los siguientes: 1) tratamiento de mantenimiento si no hay evolución con la quimioterapia de primera línea que contiene platino O 2) tratamiento posterior para cualquiera de los siguientes casos: a) carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico, b) carcinoma urotelial de vejiga con recidiva local músculo-invasiva o enfermedad persistente en una vejiga preservada, c) carcinoma urotelial de vejiga con recidiva metastásica o local postcistectomía, d) carcinoma primario recurrente de uretra, o e) carcinoma urotelial de vejiga con enfermedad en estadio II-IV. Para el carcinoma de células renales: la enfermedad está avanzada, en recaída o en estadio IV, Y el medicamento solicitado se utilizará en combinación con axitinib como tratamiento de primera línea. En caso de neoplasia trofoblástica gestacional, el medicamento solicitado se utilizará para la enfermedad resistente a la quimioterapia multiagente cuando la paciente cumpla uno de los siguientes requisitos: 1) enfermedad de alto riesgo O 2) presenta un tumor trofoblástico intermedio recurrente o progresivo (tumor trofoblástico de localización placentaria o tumor trofoblástico epitelioides). En el caso del carcinoma de células de Merkel, el medicamento solicitado se utiliza para la enfermedad metastásica. Para el carcinoma endometrial, 1) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de segunda línea, 2) la enfermedad es recurrente o metastásica, Y 3) la enfermedad presenta inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) o deficiencia de reparación de emparejamiento erróneos (dMMR).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BELBUCA
Nombres del medicamento	BELBUCA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se receta para el dolor asociado al cáncer, la anemia falciforme, una enfermedad terminal o el dolor que se trata mediante cuidados paliativos O el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) El medicamento solicitado se receta para un dolor lo suficientemente intenso como para requerir un tratamiento diario, todo el día y a largo plazo en un paciente que ha estado tomando un opiáceo Y 2) El paciente puede tomar con seguridad la dosis solicitada basándose en su historial de consumo de opiáceos [Nota: Este medicamento sólo debe ser recetado por profesionales sanitarios con conocimientos en el uso de opioides potentes para el tratamiento del dolor crónico] Y 3) El paciente ha sido evaluado y será monitoreado por el desarrollo de trastorno por uso de opioides Y 4) Esta solicitud es para la continuación del tratamiento para un paciente que ha estado recibiendo un agente opioide de liberación prolongada durante al menos 30 días O el paciente ha tomado un opioide de liberación inmediata durante al menos una semana.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BELEODAQ
Nombres del medicamento	BELEODAQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia/linfoma de células T en adultos, linfoma extraganglionar de células NK/T, linfoma hepatoesplénico de células T, linfoma anaplásico de células grandes (ALCL) asociado a implantes mamarios.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BENLYSTA
Nombres del medicamento	BENLYSTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Para pacientes nuevos en el tratamiento: lupus activo grave del sistema nervioso central.
Información médica requerida	Para lupus eritematoso sistémico depresivo (SLE): 1) el paciente está recibiendo actualmente un régimen terapéutico estándar estable (por ejemplo, corticosteroides, antipalúdicos o medicamentos antiinflamatorios no esteroides orales (NSAID)) para el SLE, O 2) el paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación al régimen terapéutico estándar para el SLE. En caso de nefritis lúpica: 1) el paciente está recibiendo actualmente un régimen terapéutico estándar estable (por ejemplo, corticosteroides, ciclofosfamida, micofenolato mofetilo o azatioprina) para la nefritis lúpica O 2) el paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación al régimen terapéutico estándar para la nefritis lúpica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BEOVU
Nombres del medicamento	BEOVU
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	BERINERT
Nombres del medicamento	BERINERT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el paciente padece HAE con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece HAE con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 5 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BESPONSA
Nombres del medicamento	BESPONSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de leucemia linfoblástica aguda (ALL) de células B precursoras: El tumor es CD22-positivo, confirmado por pruebas o análisis para identificar la proteína CD22 en la superficie de la célula B.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BESPONSA
Nombres del medicamento	BESREMI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BETASERON
Nombres del medicamento	BETASERON
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BEXAROTENE
Nombres del medicamento	BEXAROTENE, TARGRETIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Micosis fungoide (MF)/Síndrome de Sezary (SS), linfoma anaplásico de células grandes (ALCL) cutáneo primario CD30 positivo, papulosis linfomatoide (LyP) CD30 positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BOSENTAN
Nombres del medicamento	BOSENTAN, TRACLEER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BOSULIF
Nombres del medicamento	BOSULIF
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia linfoblástica aguda de células B con cromosoma Filadelfia positivo (Ph+ B-ALL), neoplasias mieloides y/o linfoides con eosinofilia y reordenamiento ABL1 en fase crónica o blástica
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de leucemia mieloide crónica (CML), incluidos los pacientes con diagnóstico reciente de CML y los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: 1) El diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL, Y 2) Si el paciente experimentó resistencia a un inhibidor alternativo de la tirosina cinasa, el paciente es negativo para todas las mutaciones siguientes: T315I, G250E, V299L y F317L, Y 3) el paciente ha experimentado resistencia o intolerancia a imatinib o dasatinib. En caso de B-ALL, incluidos los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: 1) El diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL, Y 2) Si el paciente experimentó resistencia a un inhibidor alternativo de la tirosina cinasa, el paciente es negativo para todas las mutaciones siguientes: T315I, G250E, V299L y F317L.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BOTOX
Nombres del medicamento	BOTOX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Salivación excesiva secundaria a enfermedad de Parkinson avanzada, espasmo hemifacial, fisura anal crónica, acalasia, disfonía espasmódica (distonía laríngea), distonía oromandibular, hiperhidrosis palmar, temblor esencial, dolor miofascial.
Criterios de exclusión	Uso cosmético.
Información médica requerida	Para la profilaxis de migraña crónica, tratamiento inicial: el paciente experimenta al menos 15 días de dolor de cabeza al mes, y respondió inadecuadamente, intolerancia o tiene una contraindicación a un inhibidor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). En caso de profilaxis de la migraña crónica, continuación del tratamiento (después de 2 ciclos de inyección): Más días sin dolor de cabeza al mes desde el inicio del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Migraña crónica, tratamiento inicial: 6 meses; renovación: año del plan. Año del plan para todas las demás indicaciones.
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BRAFTOVI
Nombres del medicamento	BRAFTOVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento sistémico complementario para melanoma cutáneo, adenocarcinoma apendicular
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) El medicamento solicitado se utilizará para uno de los siguientes: a) tratamiento posterior de enfermedad avanzada o metastásica, b) tratamiento primario de metástasis metacrónicas no resecables. Para el melanoma: 1) El tumor es positivo para la mutación activadora BRAF V600 (por ejemplo, V600E o V600K), Y 2) El medicamento solicitado se utilizará como agente único o en combinación con binimetinib, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará para cualquiera de los siguientes casos: a) enfermedad irresecable, resecable limitada o metastásica, b) tratamiento sistémico complementario.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BRIVIACT
Nombres del medicamento	BRIVIACT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una de las siguientes contraindicaciones: Aptiom (a partir de 4 años), Xcopri (a partir de 18 años), Spritam (a partir de 4 años).
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 mes de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BRIVIACT INJ
Nombres del medicamento	BRIVIACT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una de las siguientes contraindicaciones: Aptiom (a partir de 4 años), Xcopri (a partir de 18 años), Spritam (a partir de 4 años).
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 mes de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BRONCHITOL
Nombres del medicamento	BRONCHITOL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BRUKINSA
Nombres del medicamento	BRUKINSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BUDESONIDA CAP
Nombres del medicamento	BUDESONIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Inducción y mantenimiento de la remisión clínica de la colitis microscópica en adultos
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el mantenimiento de la remisión clínica de la colitis microscópica: el paciente ha presentado una recurrencia de los síntomas tras la interrupción del tratamiento de inducción.
Restricciones de edad	Crohn, tratamiento: 8 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Colitis microscópica, mantenimiento: 12 meses, todas las demás indicaciones: 3 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BUPRENORFINA
Nombres del medicamento	BUPRENORPHINE HCL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se receta para el tratamiento del trastorno por consumo de opiáceos Y el paciente cumple uno de los siguientes requisitos: 1) La paciente está embarazada o en período de lactancia, y el medicamento solicitado se está recetando para tratamiento de inducción y/o tratamiento de mantenimiento posterior para el tratamiento del trastorno por consumo de opiáceos O 2) El medicamento solicitado se está recetando para tratamiento de inducción para la transición del consumo de opiáceos al tratamiento del trastorno por consumo de opiáceos O 3) El medicamento solicitado se está recetando para tratamiento de mantenimiento para el tratamiento del trastorno por consumo de opiáceos en un paciente que es intolerante a la naloxona.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BUPRENORFINA PARCHE
Nombres del medicamento	BUPRENORPHINE, BUTRANS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se receta para el dolor asociado al cáncer, la anemia falciforme, una enfermedad terminal o el dolor que se trata mediante cuidados paliativos O el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) El medicamento solicitado se receta para un dolor lo suficientemente intenso como para requerir un tratamiento diario, todo el día y a largo plazo en un paciente que ha estado tomando un opiáceo Y 2) El paciente puede tomar con seguridad la dosis solicitada basándose en su historial de consumo de opiáceos [Nota: Este medicamento sólo debe ser recetado por profesionales sanitarios con conocimientos en el uso de opioides potentes para el tratamiento del dolor crónico] Y 3) El paciente ha sido evaluado y será monitoreado por el desarrollo de trastorno por uso de opioides Y 4) Esta solicitud es para la continuación del tratamiento para un paciente que ha estado recibiendo un agente opioide de liberación prolongada durante al menos 30 días O el paciente ha tomado un opioide de liberación inmediata durante al menos una semana.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	BYDUREON
Nombres del medicamento	BYDUREON BCISE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 10 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulínico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).

Grupo de autorización previa	BYETTA
Nombres del medicamento	BYETTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulínico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).
Grupo de autorización previa	BYLVAY
Nombres del medicamento	BYLVAY, BYLVAY (PELLETS)
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento del prurito en la colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC) (solicitudes iniciales): 1) el diagnóstico de PFIC se ha confirmado mediante pruebas genéticas, 2) el paciente no padece PFIC tipo 2 con variantes ABCB11 que dan lugar a la ausencia total o no funcional de la proteína bomba de exportación de sales biliares (BSEP-3), 3) el paciente no padece ninguna otra enfermedad hepática concomitante, Y 4) el paciente no ha recibido un trasplante de hígado. Para el tratamiento del prurito en la PFIC (solicitudes de continuación): el paciente ha experimentado un beneficio del tratamiento (por ejemplo, mejoría del prurito). Para el tratamiento del prurito colestásico en un paciente con síndrome de Alagille (ALGS) (continuación): el paciente se ha beneficiado del tratamiento (por ejemplo, mejoría del prurito).
Restricciones de edad	Para PFIC: 3 meses o más, Para ALGS: 12 meses o más
Restricciones del recetador	Recetado por un hepatólogo o gastroenterólogo o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	BYOOVIZ
Nombres del medicamento	BYOOVIZ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	CABLIVI
Nombres del medicamento	CABLIVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de púrpura trombocitopénica trombótica adquirida (aTTP): Evolución inicial y prolongación del tratamiento: El paciente no ha experimentado más de 2 recurrencias de aTTP mientras tomaba el medicamento solicitado. Para el curso inicial de aTTP: 1) la solicitud es para tratamiento durante el periodo de recambio plasmático y/o directamente tras la finalización del recambio plasmático (PE), 2) el paciente recibirá o ha recibido el medicamento solicitado con PE, 3) el medicamento solicitado se administrará en combinación con tratamiento inmunosupresor, y 4) el paciente no recibirá el medicamento solicitado más allá de 30 días desde el cese del PE a menos que el paciente tenga aTTP persistente documentado. En caso de prolongación del tratamiento aTTP: 1) la solicitud se refiere a la prolongación del tratamiento tras el ciclo inicial del medicamento solicitado (ciclo inicial: tratamiento con el medicamento solicitado durante y 30 días después del recambio plasmático), 2) el paciente presenta signos documentados de aTTP subyacente persistente (ejemplo: niveles de actividad de ADAMTS13 gravemente reducidos [menos del 10%]), 3) el medicamento solicitado se administrará en combinación con un tratamiento inmunosupresor, y 4) el paciente no ha recibido una prolongación previa del tratamiento de 28 días tras el ciclo inicial del medicamento solicitado para este ciclo de tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	Curso inicial: 60 días, Extensión: 28 días
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CABOMETYX
Nombres del medicamento	CABOMETYX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, tumor del estroma gastrointestinal, carcinoma endometrial
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma de células renales: La enfermedad está avanzada, en recaída o en estadio IV. Para carcinoma pulmonar no microcítico: 1) la enfermedad es reordenada durante la transfección (RET) positiva Y 2) la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica. Para el carcinoma hepatocelular: el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior. Para tumor del estroma gastrointestinal (GIST): El paciente cumple uno de los siguientes requisitos: 1) la enfermedad es irsecable, recurrente/progresiva o metastásica, Y el paciente no respondió a un tratamiento aprobado por la FDA (por ejemplo, imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib) O 2) el medicamento solicitado se utilizará para paliar los síntomas si se tolera previamente y es eficaz. Para el sarcoma de Ewing y osteosarcoma: el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior. Para el cáncer de tiroides diferenciado (DTC) (folicular, papilar, de células de Hurthle): 1) La enfermedad es localmente avanzada o metastásica, 2) la enfermedad ha progresado después de un tratamiento dirigido al receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR), Y 3) el paciente es refractario al tratamiento con yodo radiactivo (RAI) o no elegible para RAI. Para el carcinoma endometrial: 1) la enfermedad es recurrente o metastásica Y 2) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CALCIPOTRIENE
Nombres del medicamento	CALCIPOTRIENE, CALCITRENE, ENSTILAR, SORILUX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de psoriasis: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un esteroide tópico.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CALQUENCE
Nombres del medicamento	CALQUENCE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Macroglobulinemia de Waldenstrom (linfoma linfoplasmocítico), linfoma de la zona marginal (incluyendo linfoma de la zona marginal extraganglionar del estómago, linfoma de la zona marginal extraganglionar de localizaciones no gástricas, linfoma de la zona marginal ganglionar, linfoma de la zona marginal esplénico)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para linfoma de la zona marginal (lo que incluye linfoma de la zona marginal extraganglionar del estómago, linfoma de la zona marginal extraganglionar de los sitios no gástricos, linfoma de la zona marginal ganglionar y linfoma de la zona marginal esplénica): el medicamento solicitado será usado como tratamiento de la enfermedad en recaída, refractaria o progresiva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CAMZYOS
Nombres del medicamento	CAMZYOS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para miocardiopatía hipertrófica obstructiva: 1) antes de iniciar el tratamiento, el paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (LVEF) del 55% o superior y 2) el paciente presenta síntomas de clase II-III de la New York Heart Association (NYHA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CAPRELSA
Nombres del medicamento	CAPRELSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma diferenciado de tiroides: papilar, folicular y de células de Hurthle.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CARBAGLU
Nombres del medicamento	CARBAGLU, CARGLUMIC ACID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de deficiencia de N-acetilglutamato sintasa (NAGS): El diagnóstico de la deficiencia de NAGS se confirmó mediante pruebas enzimáticas, bioquímicas o genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CAYSTON
Nombres del medicamento	CAYSTON
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de los síntomas respiratorios en pacientes con fibrosis quística: 1) Pseudomonas aeruginosa está presente en los cultivos de las vías respiratorias del paciente, O 2) El paciente tiene antecedentes de infección o colonización por pseudomonas aeruginosa en las vías respiratorias.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CERDELGA
Nombres del medicamento	CERDELGA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de enfermedad de Gaucher tipo 1 (GD1): 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática de la beta-glucocerebrosidasa o mediante pruebas genéticas, y 2) Se ha establecido el estado de metabolizador CYP2D6 del paciente mediante una prueba autorizada por la FDA, y 3) El paciente es un metabolizador extensivo CYP2D6, un metabolizador intermedio o un metabolizador deficiente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CEREZYME
Nombres del medicamento	CEREZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Enfermedad de Gaucher de tipo 2, enfermedad de Gaucher de tipo 3.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para enfermedad de Gaucher: El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática beta-glucocerebrosidasa o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CLORDIAZEPÓXIDO
Nombres del medicamento	CHLORDIAZEPOXIDE HCL, CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todas las indicaciones: el médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. (Nota: La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). Para el tratamiento de trastornos de ansiedad: 1) El medicamento solicitado se está utilizando simultáneamente con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (SSRI) o un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI) hasta que el SSRI/SNRI sea eficaz para los síntomas de ansiedad, O 2) el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para AL MENOS DOS agentes de las siguientes clases: a) inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), o b) inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI):
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Alivio a corto plazo ansiedad-preop y ansiedad-1 mes, Trastorno de ansiedad-4 meses, Abs. alcoholica-AÑOPlan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores.

Grupo de autorización previa	CHOLBAM
Nombres del medicamento	CHOLBAM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trastornos de la síntesis de ácidos biliares debidos a defectos de una sola enzima (SED) y tratamiento complementario de trastornos peroxisomales (PD): El diagnóstico se confirmó mediante espectrometría de masas u otras pruebas bioquímicas o genéticas. En caso de trastornos de la síntesis de ácidos biliares debidos a SED y tratamiento complementario de PD, continuación del tratamiento: El paciente ha logrado y mantenido una mejoría de la función hepática.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CHOLBAM
Nombres del medicamento	CIBINQO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para dermatitis atópica (AD), continuación de tratamiento: El paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva.
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 4 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CIMERLI
Nombres del medicamento	CIMERLI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	CINRYZE
Nombres del medicamento	CINRYZE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de prevención de crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el paciente padece angioedema hereditario (HAE) con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece angioedema hereditario con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CLOBAZAM
Nombres del medicamento	CLOBAZAM, ONFI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Convulsiones asociadas al síndrome de Dravet
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut (LGS): 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CLOMIPRAMINE
Nombres del medicamento	ANAFRANIL, CLOMIPRAMINE HYDROCHLORID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Depresión, trastorno de pánico
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el trastorno obsesivo-compulsivo (OCD) y el trastorno de pánico: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a cualquiera de los siguientes: un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI), un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (SSRI). En caso de depresión: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes: inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), mirtazapina, bupropión.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CLORAZEPATE
Nombres del medicamento	CLORAZEPATE DIPOTASSIUM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todas las indicaciones: Para todas las indicaciones: el médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. (Nota: La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). Para el tratamiento de trastornos de ansiedad: 1) El medicamento solicitado se está utilizando simultáneamente con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (SSRI) o un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI) hasta que el SSRI/SNRI sea eficaz para los síntomas de ansiedad, O 2) el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para AL MENOS DOS agentes de las siguientes clases: a) inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), o b) inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI):
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Alivio de ansiedad a corto plazo-1 mes, Trastornos de ansiedad-4 meses, Todos los demás diagnósticos - Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores.

Grupo de autorización previa CLOZAPINE ODT
Nombres del medicamento CLOZAPINE ODT
Indicador de indicación PA Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado -
Criterios de exclusión -
Información médica requerida -
Restricciones de edad -
Restricciones del recetador -
Duración de la cobertura Año del plan
Otros criterios -

Grupo de autorización previa COLUMVI
Nombres del medicamento COLUMVI
Indicador de indicación PA Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado -
Criterios de exclusión -
Información médica requerida -
Restricciones de edad -
Restricciones del recetador -
Duración de la cobertura Año del plan
Otros criterios -

Grupo de autorización previa COMETRIQ
Nombres del medicamento COMETRIQ
Indicador de indicación PA Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC), carcinoma diferenciado de tiroides: papilar, folicular y de células de Hurthle.
Criterios de exclusión -
Información médica requerida Para NSCLC: El medicamento solicitado se utiliza para NSCLC cuando la enfermedad del paciente expresa reordenamiento durante la transfección del gen (RET).
Restricciones de edad -
Restricciones del recetador -
Duración de la cobertura Año del plan
Otros criterios -

Grupo de autorización previa	COPIKTRA
Nombres del medicamento	COPIKTRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma hepatoesplénico de células T, linfoma anaplásico de células grandes (ALCL) asociado a implantes mamarios, linfoma periférico de células T
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia linfocítica crónica (CLL)/linfoma linfocítico pequeño (SLL), linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a implantes mamarios y linfoma periférico de células T: el paciente tiene enfermedad en recaída o refractaria. Para el linfoma hepatoesplénico de células T: el paciente presenta una enfermedad refractaria.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	COTELLIC
Nombres del medicamento	COTELLIC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer del sistema nervioso central (CNS) (es decir, glioma, glioblastoma, astrocitoma, oligodendroglioma), tratamiento sistémico complementario para melanoma cutáneo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer del sistema nervioso central (CNS) (es decir, glioma, glioblastoma, astrocitoma, oligodendroglioma): 1) El tumor es positivo para la mutación activadora BRAF V600E, Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con vemurafenib. Para el melanoma: 1) El tumor es positivo para mutación activadora de BRAF V600 (por ejemplo, V600E o V600K), Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con vemurafenib, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará para cualquiera de los siguientes casos: a) enfermedad irresecable, resecable limitada o metastásica, b) tratamiento sistémico complementario.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CRESEMBA
Nombres del medicamento	CRESEMBA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Candidiasis esofágica refractaria a fluconazol en un paciente con HIV
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utiliza por vía oral. Para aspergilosis invasiva y candidiasis esofágica refractaria al fluconazol en un paciente con HIV: el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al voriconazol.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Aspergilosis invasiva: 3 meses. Mucormicosis invasiva: 6 meses. Candidiasis esofágica: 1 mes
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CRESEMBA INJ
Nombres del medicamento	CRESEMBA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utiliza por vía oral administrado mediante sonda nasogástrica (NG) o intravenoso. Para aspergilosis invasiva: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al voriconazol.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Aspergilosis invasiva: 3 meses. Mucormicosis invasiva: 6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CRINONE
Nombres del medicamento	CRINONE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Profilaxis del parto prematuro en mujeres con cuello uterino corto
Criterios de exclusión	Recetado para promover la fertilidad
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CRYSVITA
Nombres del medicamento	CRYSVITA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CUTAQUIG
Nombres del medicamento	CUTAQUIG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	CUVITRU
Nombres del medicamento	CUVITRU
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	CUVRIOR
Nombres del medicamento	CUVRIOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CYRAMZA
Nombres del medicamento	CYRAMZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Adenocarcinoma esofágico, carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente, adenocarcinoma apendicular, mesotelioma pleural, mesotelioma pericárdico, mesotelioma de túnica vaginal del testículo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer colorrectal y adenocarcinoma apendicular: el paciente tiene enfermedad avanzada o metastásica. Para NSCLC: el paciente tiene enfermedad recurrente, avanzada o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CYSTADROPS
Nombres del medicamento	CYSTADROPS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cistinosis: 1) El diagnóstico fue confirmado por CUALQUIERA de los siguientes: a) la presencia de un aumento de la concentración de cistina en leucocitos, O b) pruebas genéticas, O c) demostración de cristales de cistina en la córnea mediante examen con lámpara de hendidura, Y 2) el paciente presenta acumulación de cristales de cistina en la córnea.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	CYSTAGON
Nombres del medicamento	CYSTAGON
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cistinosis nefropática: El diagnóstico se confirmó mediante CUALQUIERA de los siguientes: 1) presencia de un aumento de la concentración de cistina en leucocitos, O 2) pruebas genéticas, O 3) demostración de cristales de cistina en la córnea mediante examen con lámpara de hendidura.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	CYSTARAN
Nombres del medicamento	CYSTARAN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cistinosis: 1) El diagnóstico fue confirmado por CUALQUIERA de los siguientes: a) la presencia de un aumento de la concentración de cistina en leucocitos, O b) pruebas genéticas, O c) demostración de cristales de cistina en la córnea mediante examen con lámpara de hendidura, Y 2) el paciente presenta acumulación de cristales de cistina en la córnea.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DALFAMPRIDINE
Nombres del medicamento	AMPYRA, DALFAMPRIDINE ER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de esclerosis múltiple, el paciente debe cumplir lo siguiente: Para los nuevos pacientes, antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe demostrar una incapacidad permanente para caminar. En caso de continuación del tratamiento: el paciente debe haber experimentado una mejoría en la velocidad de la marcha O en otra medida objetiva de la capacidad de caminar desde el inicio con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DARAPRIM
Nombres del medicamento	PYRIMETHAMINE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Profilaxis de la toxoplasmosis, profilaxis de la neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> , tratamiento y profilaxis secundaria de la cistosisporiasis.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para profilaxis primaria de toxoplasmosis y profilaxis de neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> (PCP): 1) El paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación al trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) Y 2) El paciente ha tenido un recuento de células CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico en los últimos 3 meses. En caso de profilaxis de la toxoplasmosis secundaria: El paciente ha tenido un recuento de células CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico en los últimos 6 meses. Para el tratamiento de la cistosisporiasis: El paciente ha experimentado intolerancia o tiene una contraindicación al TMP-SMX. En caso de profilaxis de la cistosisporiasis secundaria: 1) El paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación al TMP-SMX Y 2) El paciente ha tenido un recuento de células CD4 inferior a 200 células por milímetro cúbico en los últimos 6 meses.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Tratamiento de toxoplasmosis congénita: Año del plan. Tratamiento de toxoplasmosis adquirida, profilaxis de toxoplasmosis primaria, profilaxis de neumonía por <i>pneumocystis</i> (PCP): 3 meses; Sec toxo ppx, cysto tx/ppx: 6 meses.
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DARZALEX
Nombres del medicamento	DARZALEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras recidivante/refractaria
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DARZALEX FASPRO
Nombres del medicamento	DARZALEX FASPRO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DAURISMO
Nombres del medicamento	DAURISMO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento de postinducción tras una respuesta a un tratamiento previo con el mismo régimen para la leucemia mieloide aguda (AML). AML recidivante/refractaria como componente de la repetición del régimen de inducción inicial con éxito.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide aguda: 1) el medicamento solicitado debe utilizarse en combinación con citarabina, 2) el paciente tiene 75 años o más O presenta comorbilidades que impiden la quimioterapia intensiva, Y 3) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento para la terapia de inducción, la terapia de postinducción o la enfermedad recidivante o refractaria.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DAYBUE
Nombres del medicamento	DAYBUE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DEFERASIROX
Nombres del medicamento	DEFERASIROX, EXJADE, JADENU, JADENU SPRINKLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para sobrecarga crónica de hierro debida a transfusiones de sangre: el nivel de ferritina sérica pretratamiento es superior a 1000 mcg/L.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DEFEROXAMINE
Nombres del medicamento	DEFEROXAMINE MESYLATE, DESFERAL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Toxicidad del aluminio en pacientes sometidos a diálisis
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para sobrecarga crónica de hierro: el nivel de ferritina sérica pretratamiento es superior a 1000 mcg/L.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	DEMSER
Nombres del medicamento	DEMSER, METYROSINE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al antagonista adrenérgico alfa.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DESVENLAFAXINE
Nombres del medicamento	DESVENLAFAXINE ER, PRISTIQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el trastorno depresivo mayor (MDD): El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes: inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), mirtazapina, bupropión.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DEXMETHYLPHENIDATE
Nombres del medicamento	DEXMETHYLPHENIDATE HCL, DEXMETHYLPHENIDATE HCL ER, DEXMETHYLPHENIDATE HYDROC, FOCALIN, FOCALIN XR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Fatiga por cáncer
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	1) El paciente tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) o trastorno por déficit de atención (ADD) O 2) El medicamento solicitado está siendo recetado para el tratamiento de la fatiga por cáncer después de haberse descartado otras causas de fatiga.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DHE NASAL
Nombres del medicamento	DIHYDROERGOTAMINE MESYLAT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Se denegará la cobertura cuando se utilice junto con inhibidores potentes de CYP3A4 (por ejemplo, ritonavir, nelfinavir, indinavir, eritromicina, claritromicina).
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un triptano agonista de los receptores 5-HT1.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DIACOMIT
Nombres del medicamento	DIACOMIT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-El paciente tiene 6 meses de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DIAZEPAM
Nombres del medicamento	DIAZEPAM, DIAZEPAM INTENSOL, VALIUM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todas las indicaciones: Para todas las indicaciones: el médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. (Nota: La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). Para el tratamiento de trastornos de ansiedad: 1) El medicamento solicitado se está utilizando simultáneamente con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (SSRI) o un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI) hasta que el SSRI/SNRI sea eficaz para los síntomas de ansiedad, O 2) el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para AL MENOS DOS agentes de las siguientes clases: a) inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), o b) inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI):
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Alivio a corto plazo de la ansiedad-1 mes, espasmo muscular esquelético-3 meses, Trastornos de ansiedad-4 meses, Otros diagnósticos-Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores. Se aplica al mayor de 5 días acumulativos de terapia al año.

Grupo de autorización previa	DIBENZYLINE
Nombres del medicamento	DIBENZYLINE, PHENOXYBENZAMINE HYDROCHL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al bloqueante selectivo de los receptores adrenérgicos alfa 1 (por ejemplo, doxazosina)
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DICLOFENAC 1.5% SOL
Nombres del medicamento	DICLOFENAC SODIUM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para osteoartritis de rodilla: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia al diclofenac 1% gel.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DICLOFENAC 3% GEL
Nombres del medicamento	DICLOFENAC SODIUM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a UNO de los siguientes: A) imiquimod crema al 5%, B) fluorouracilo crema o solución.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	3 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DOJOLVI
Nombres del medicamento	DOJOLVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trastornos de oxidación de ácidos grasos de cadena larga (LC-FAOD): Se cumplen al menos dos de los siguientes criterios diagnósticos: a) elevación de la acilcarnitina específica de la enfermedad (por ejemplo, C16 y/o C18:1 para la deficiencia de CPT2, C16-OH y/o C18 y otras acilcarnitinas para la deficiencia de LCHAD y TFP, C14:1 y/o otras acilcarnitinas de cadena larga para la deficiencia de VLCAD) en una muestra de sangre o plasma del recién nacido, b) baja actividad enzimática en fibroblastos cultivados, c) una o más mutaciones patogénicas conocidas (p. ej., CPT1A, SLC25A20, CPT2, ACADVL, HADHA, HADHB). Para LC-FAOD, continuación del tratamiento: El paciente se beneficia del tratamiento (por ejemplo, mejora de los síntomas musculares y/o de la tolerancia al ejercicio).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	DOPTELET
Nombres del medicamento	DOPTELET
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trombocitopenia en pacientes con enfermedad hepática crónica: El recuento de plaquetas no transfundidas antes de un procedimiento programado es inferior a 50,000/mcL. En caso de trombocitopenia inmune crónica (ITP): 1) Para nuevos comienzos: a) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o es intolerante a un tratamiento previo como corticosteroides o inmunoglobulinas, Y b) El recuento de plaquetas no transfundidas en cualquier momento anterior al inicio del medicamento solicitado es inferior a 30,000/mcL O de 30,000 a 50,000/mcL con hemorragia sintomática o factor(es) de riesgo de hemorragia (por ejemplo, someterse a un procedimiento médico u odontológico en el que se prevea pérdida de sangre, comorbilidades como úlcera péptica e hipertensión, tratamiento anticoagulante, profesión o estilo de vida que predisponga al paciente a sufrir traumatismos). 2) En caso de continuación del tratamiento, la respuesta del recuento plaquetario al medicamento solicitado: a) El recuento plaquetario actual es inferior o igual a 200,000/mcL O b) El recuento plaquetario actual es superior a 200,000/mcL e inferior o igual a 400,000/mcL y la dosificación se ajustará a un recuento plaquetario suficiente para evitar hemorragias clínicamente importantes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Enfermedad hepática crónica: 1 mes, ITP inicial: 6 meses, reautorización de ITP: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DUOBRII
Nombres del medicamento	DUOBRII
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la psoriasis en placas: el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento o intolerancia a un corticosteroide tópico.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	DUPIXENT
Nombres del medicamento	DUPIXENT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para dermatitis atópica (AD), tratamiento inicial: 1) el paciente tiene una enfermedad de moderada a grave, Y 2) el paciente ha tenido una respuesta inadecuada al tratamiento con un corticosteroide tópico o un inhibidor tópico de la calcineurina O los corticosteroides tópicos y los inhibidores tópicos de la calcineurina no son aconsejables para el paciente. Para AD, continuación del tratamiento: El paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva. Para el asma dependiente de corticosteroides orales, tratamiento inicial: El paciente tiene un control inadecuado del asma a pesar del tratamiento actual con los dos medicamentos siguientes: 1) Corticosteroide inhalado a dosis altas Y 2) Controlador adicional (es decir, agonista beta2 de acción prolongada, antagonista muscarínico de acción prolongada, modificador de leucotrienos o teofilina de liberación sostenida) a menos que el paciente presente intolerancia o tiene una contraindicación a dichos tratamientos. Para asma de moderado a grave, tratamiento inicial: El paciente tiene un recuento inicial de eosinófilos en sangre de al menos 150 células por microlitro y el asma sigue estando insuficientemente controlado a pesar del tratamiento actual con los dos medicamentos siguientes: 1) Corticosteroide inhalado a dosis de medias a altas Y 2) Controlador adicional (es decir, agonista beta2 de acción prolongada, antagonista muscarínico de acción prolongada, modificador de leucotrienos o teofilina de liberación sostenida) a menos que el paciente presente intolerancia o tiene una contraindicación a dichos tratamientos. Para asma, continuación del tratamiento: El control del asma ha mejorado con el tratamiento con el medicamento solicitado, como lo demuestra la reducción de la frecuencia y/o gravedad de los síntomas y exacerbaciones o la reducción de la dosis diaria de corticosteroides orales de mantenimiento. En caso de rinosinusitis crónica con poliposis nasal (CRSwNP): 1) El medicamento solicitado se utiliza como tratamiento complementario de mantenimiento, Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento con Xhance (fluticasona).
Restricciones de edad	Dermatitis atópica: 6 meses o más, Asma: 6 años o más, rinosinusitis crónica con poliposis nasal y prurigo nodular: 18 años de edad o más, esofagitis eosinofílica: 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	AD, Inicio: 4 meses, PN, inicial: 6 meses, todas las demás: Año del plan
Otros criterios	En caso de esofagitis eosinofílica (EoE), tratamiento inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante biopsia esofágica, Y 2) El paciente pesa al menos 40 kilogramos, Y 3) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia, o el paciente tiene una contraindicación a un corticosteroide tópico (por ejemplo, propionato de fluticasona o budesonida). Para EoE, continuación del tratamiento: El paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva. Para el prurigo nodular (PN), tratamiento inicial: El paciente ha tenido una respuesta terapéutica inadecuada a un corticosteroide tópico O los corticosteroides tópicos no son aconsejables para el paciente. Para PN, continuación del tratamiento: El paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva.

Grupo de autorización previa	DYSPORT
Nombres del medicamento	DYSPORT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Blefaroespasmos.
Criterios de exclusión	Uso cosmético.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EGRIFTA
Nombres del medicamento	EGRIFTA SV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Uso para pérdida de peso
Información médica requerida	Para pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con lipodistrofia: El paciente está recibiendo tratamiento antirretroviral. Para pacientes que han recibido al menos 6 meses del medicamento solicitado: El paciente ha demostrado una clara mejoría clínica con respecto a la situación inicial, avalada por una medición del perímetro de la cintura o una tomografía computarizada (CT).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en enfermedades infecciosas o endocrinólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ELAPRASE
Nombres del medicamento	ELAPRASE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para mucopolisacaridosis II (MPS II): El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática iduronato-2-sulfatasa (IDS) o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-El paciente tiene 16 meses de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ELELYSO
Nombres del medicamento	ELELYSO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de enfermedad de Gaucher tipo 1: El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática beta-glucocerebrosidasa o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ELFABRIO
Nombres del medicamento	ELFABRIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente cumple CUALQUIERA de los requisitos siguientes: 1) El diagnóstico de la enfermedad de Fabry se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática alfa-galactosidasa o mediante pruebas genéticas O 2) El paciente es portador obligado sintomático.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ELIGARD
Nombres del medicamento	ELIGARD
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumores recidivantes de glándulas salivales con receptores androgénicos positivos
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EMGALITY
Nombres del medicamento	EMGALITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento preventivo de la migraña, inicial: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento de prueba de 4 semanas de cualquiera de los siguientes: Antiepilépticos (AED), bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos O 2) El paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación que prohibiría una prueba de 4 semanas de cualquiera de los siguientes: Antiepilépticos (AED), bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos. Para el tratamiento preventivo de la migraña, continuación: El paciente recibió al menos 3 meses de tratamiento con el medicamento solicitado, y el paciente tuvo una reducción de los días de migraña al mes desde el inicio. En caso de cefalea en racimos episódica, inicial: El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un triptano agonista de los receptores 5-HT1. En caso de cefalea en racimos episódica, continuación: El paciente recibió el medicamento solicitado durante al menos 3 semanas de tratamiento y presentó una reducción de la frecuencia semanal de ataques de cefalea en racimos con respecto al valor inicial.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 3 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EMPAVELI
Nombres del medicamento	EMPAVELI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) (inicial): 1) el diagnóstico de PNH se confirmó mediante la detección de una deficiencia de proteínas ancladas a glicosilfosfatidilinositol (GPI-AP) demostrada por: a) al menos un 5% de células PNH o b) al menos un 51% de células polimorfonucleares (PMN) deficientes en GPI-AP Y 2) se utiliza la citometría de flujo para demostrar la deficiencia de GPI-AP. Para PNH (continuación del tratamiento): 1) no hay indicios de toxicidad inaceptable o evolución de la enfermedad mientras esté en el régimen actual Y 2) el paciente ha respondido positivamente al tratamiento (por ejemplo, mejora en los niveles de hemoglobina, normalización de los niveles de lactato deshidrogenasa [LDH]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	PNH, Inicio: 6 meses, continuación de PNH: Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	EMPLICITI
Nombres del medicamento	EMPLICITI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para mieloma múltiple: El paciente debe haber sido tratado con al menos una terapia previa.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EMSAM
Nombres del medicamento	EMSAM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el trastorno depresivo mayor (MDD): 1) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a DOS de los siguientes: inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), mirtazapina, bupropión O 2) El paciente es incapaz de tragar formulaciones orales.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ENBREL
Nombres del medicamento	ENBREL, ENBREL MINI, ENBREL SURECLICK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Hidradenitis supurativa, espondiloartritis axial no radiográfica
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al metotrexato (MTX) o 2) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. En caso de espondilitis anquilosante activa y la espondiloartritis axial radiográfica (sólo en nuevos comienzos): el paciente presentó una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) O el paciente tiene una contraindicación que prohibiría probar con NSAID. En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% del BSA o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]). En caso de hidradenitis supurativa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente tiene una enfermedad grave y refractaria.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ENDARI
Nombres del medicamento	ENDARI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 5 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ENHERTU
Nombres del medicamento	ENHERTU
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer colorrectal con crecimiento HER2, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), adenocarcinoma esofágico HER2-positivo recidivante, localmente avanzado o metastásico, adenocarcinoma gástrico o de la unión esofagogástrica HER2-positivo recidivante, metástasis cerebrales en pacientes con cáncer de mama HER2-positivo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	ENJAYMO
Nombres del medicamento	ENJAYMO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de enfermedad por aglutininas frías (continuación del tratamiento): el paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva (por ejemplo, mejoría de los niveles de hemoglobina, marcadores de hemólisis [por ejemplo, bilirrubina, haptoglobina, lactato deshidrogenasa [LDH], recuento de reticulocitos] y reducción de las transfusiones de sangre).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ENSPRYNG
Nombres del medicamento	ENSPRYNG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ENTADFI
Nombres del medicamento	ENTADFI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hiperplasia prostática benigna (BPH) en un paciente con agrandamiento de próstata: 1) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al tratamiento combinado con un alfabloqueante del formulario y finasterida Y 2) El paciente no ha recibido ya 26 semanas de tratamiento con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	26 semanas
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ENTYVIO
Nombres del medicamento	ENTYVIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EPCLUSA
Nombres del medicamento	EPCLUSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para virus de la hepatitis C (HCV): Infección confirmada por la presencia de HCV RNA en suero antes de iniciar el tratamiento. Régimen de tratamiento previsto, genotipo, antecedentes de tratamiento previo, presencia o ausencia de cirrosis (compensada o descompensada [Child Turcotte Pugh clase B o C]), presencia o ausencia de coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), presencia o ausencia de sustituciones asociadas a resistencia cuando proceda, estado del trasplante si procede. Las condiciones de cobertura y la duración específica de la autorización se basarán en las directrices de tratamiento vigentes de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (AASLD-IDSA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Los criterios se aplican de acuerdo con las directrices actuales de AASLD-IDSA
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EPIDIOLEX
Nombres del medicamento	EPIDIOLEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 año de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EPKINLY
Nombres del medicamento	EPKINLY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EPRONTIA
Nombres del medicamento	EPRONTIA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una de las siguientes contraindicaciones: Aptiom (a partir de 4 años), Xcopri (a partir de 18 años), Spritam (a partir de 4 años). Para el tratamiento en monoterapia de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias: 1) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a comprimidos o cápsulas de topiramato, O 2) El paciente tiene dificultad para tragar formas farmacéuticas orales sólidas (por ejemplo, comprimidos, cápsulas). Para el tratamiento complementario de convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un anticonvulsivo genérico, Y 2) Si el paciente tiene 6 años de edad o más, el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al Spritam. Para el tratamiento preventivo de las migrañas: 1) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a comprimidos o cápsulas de topiramato, O 2) El paciente tiene dificultad para tragar formas farmacéuticas orales sólidas (por ejemplo, comprimidos, cápsulas).
Restricciones de edad	Epilepsia: 2 años de edad o más, migraña: 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EPSOLAY
Nombres del medicamento	EPSOLAY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de las lesiones inflamatorias de la rosácea: 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia al metronidazol tópico o al ácido azelaico tópico al 15 por ciento O 2) el paciente tiene una contraindicación que prohibiría una prueba con metronidazol tópico y ácido azelaico tópico al 15 por ciento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ERGOTAMINE
Nombres del medicamento	ERGOTAMINE TARTRATE/CAFFE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Se denegará la cobertura cuando se utilice junto con inhibidores potentes de CYP3A4 (por ejemplo, ritonavir, nelfinavir, indinavir, eritromicina, claritromicina).
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos UN triptano agonista de los receptores 5-HT1.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ERIVEDGE
Nombres del medicamento	ERIVEDGE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Meduloblastoma del adulto
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para meduloblastoma del adulto: el paciente ha recibido tratamiento sistémico previo Y tiene tumor(es) con mutaciones en la vía de señalización Sonic Hedgehog.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ERLEADA
Nombres del medicamento	ERLEADA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ERLOTINIB
Nombres del medicamento	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recidivante, cordoma recidivante, carcinoma de células renales (RCC) recidivante o en estadio IV, metástasis cerebrales del carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC), cáncer de páncreas recidivante.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC (incluyendo metástasis cerebrales del NSCLC): 1) la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica Y 2) el paciente es positivo para mutación de EGFR sensibilizante. Para el cáncer de páncreas: la enfermedad es localmente avanzada, irresecable, recurrente o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ESBRIET
Nombres del medicamento	PIRFENIDONE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de fibrosis pulmonar idiopática (sólo para nuevos tratamientos): 1) un estudio mediante tomografía computarizada de alta resolución (HRCT) del tórax o una biopsia pulmonar revela el patrón de neumonía intersticial habitual (UIP), O 2) un estudio de HRCT del tórax revela un resultado distinto del patrón de UIP (por ejemplo, probable UIP, indeterminado para UIP) y el diagnóstico se apoya en una biopsia pulmonar o en una discusión multidisciplinar entre al menos un radiólogo y un neumólogo con experiencia en fibrosis pulmonar idiopática si no se ha realizado una biopsia pulmonar.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EVENITY
Nombres del medicamento	EVENITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio o un ictus en el último año.
Información médica requerida	En caso de osteoporosis posmenopáusica, la paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) antecedentes de fractura por fragilidad, O 2) puntuación T pretratamiento inferior o igual a -2.5 o puntuación T pretratamiento superior a -2.5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura (FRAX) Y el paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) indicadores de mayor riesgo de fractura (por ejemplo, edad avanzada, fragilidad, tratamiento con glucocorticoides, puntuaciones T muy bajas o mayor riesgo de caídas), o b) el paciente no respondió a un tratamiento previo con un tratamiento inyectable para la osteoporosis o no lo tolera, o c) el paciente ha sido sometido a un ensayo con bifosfonatos orales de al menos 1 año de duración o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	12 meses de tiempo de vida totales
Otros criterios	El paciente tiene una alta probabilidad de fractura con la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura (FRAX) si la probabilidad a 10 años es mayor o igual al 20 por ciento para cualquier fractura osteoporótica mayor o mayor o igual al 3 por ciento para fractura de cadera. La puntuación de riesgo estimada generada con FRAX debe multiplicarse por 1.15 para la fractura osteoporótica mayor y por 1.2 para la fractura de cadera si el tratamiento con glucocorticoides es superior a 7.5 mg (equivalente de prednisona) al día.

Grupo de autorización previa	EVEROLIMUS
Nombres del medicamento	AFINITOR DISPERZ, EVEROLIMUS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma de Hodgkin clásico, timomas y carcinomas tímicos, macroglobulinemia de Waldenstrom/linfoma linfoplasmocítico previamente tratados, sarcoma de partes blandas (tumores de células epiteloides perivasculares [PEComa] y subtipos de linfangioleiomiomatosis), tumores del estroma gastrointestinal, tumores neuroendocrinos del timo, tumores neuroendocrinos bien diferenciados de grado 3, carcinoma de tiroides (papilar, de células de Hurthle y folicular), carcinoma de endometrio, neoplasias histiocíticas (enfermedad de Rosai-Dorfman, enfermedad de Erdheim-Chester, histiocitosis de células de Langerhans)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer de mama: 1) La enfermedad es recidivante no resecable, avanzada o metastásica con receptor hormonal (HR) positivo, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo, Y 2) El medicamento solicitado se receta en combinación con exemestano, fulvestrant o tamoxifeno, Y 3) El medicamento solicitado se utiliza para el tratamiento posterior. Para el carcinoma de células renales: La enfermedad es recidivante, es avanzada o en estadio IV. Para el astrocitoma gigantocelular subependimario (SEGA): El medicamento solicitado se administra como tratamiento complementario. Para el tumor del estroma gastrointestinal: La enfermedad es recurrente/progresiva, irresecable o metastásica Y al paciente le ha fallado un tratamiento aprobado por la FDA (por ejemplo, imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib). En caso de enfermedad de Erdheim-Chester (ECD) sintomática o en recidiva/refractaria, la enfermedad de Rosai-Dorfman sintomática o en recaída/refractaria y la histiocitosis de células de Langerhans (HCL): el paciente debe presentar una mutación en la subunidad catalítica alfa de la fosfatilinositol-4,5-bifosfato 3-quinasa (PIK3CA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EVKEEZA
Nombres del medicamento	EVKEEZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el inicio del tratamiento (tx) para tratar la hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH), el paciente (pt) debe cumplir con TODO lo siguiente: A) El diagnóstico de HoFH se confirmó mediante uno de los siguientes: 1) Pruebas genéticas para confirmar dos alelos mutantes en el receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLR), la apolipoproteína B (ApoB), la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) o el locus del gen de la proteína adaptadora 1 del receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLRAP1) O 2) Antecedentes de un colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) no tratado superior a 500 mg/dL o un LDL-C tratado superior a 300 mg/dL y cualquiera de las siguientes circunstancias a) Presencia de xantomas cutáneos o tendinosos antes de los 10 años de edad, o b) Un nivel de LDL-C no tratado mayor o igual a 190 mg/dL en ambos padres, que es consistente con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HeFH), Y B) Si el paciente tiene 7 años de edad o más antes del inicio del tratamiento, el paciente está recibiendo actualmente tratamiento con una estatina de alta intensidad a una dosis máxima tolerada o a la dosis máxima aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), a menos que el paciente no tolere las estatinas o tenga una contraindicación para el tratamiento con estatinas, Y C) Si el paciente tiene 10 años o más antes del inicio del tratamiento, está recibiendo actualmente tratamiento con una terapia dirigida a PCSK9 a la dosis máxima tolerada o a la dosis máxima aprobada por la FDA a menos que haya experimentado una intolerancia o tenga una contraindicación a todos los tratamientos dirigidos a PCSK9, Y D) Antes del inicio del tratamiento, el paciente está/estaba experimentando una respuesta inadecuada al tratamiento hipolipemiente como lo indica un LDL-C tratado mayor de 100 mg/dL (o mayor de 70 mg/dL con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica), Y E) El paciente continuará recibiendo tratamiento hipolipemiente concomitante. En caso de renovación del tratamiento de la HFHo: A) El paciente cumple todos los criterios iniciales, Y B) Ha respondido al tratamiento, como lo demuestra una reducción del LDL-C con respecto al valor inicial, Y C) Está recibiendo tratamiento hipolipemiente concomitante.
Restricciones de edad	El paciente tiene 5 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EVRYSDI
Nombres del medicamento	EVRYSDI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento inicial de la atrofia muscular espinal (SMA), el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) El paciente tiene SMA tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y 2) El paciente no depende de ventilación permanente. En caso de continuación del tratamiento de SMA, el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) El paciente padece SMA tipo 1, tipo 2 o tipo 3, Y 2) El paciente ha experimentado una mejoría funcional clínicamente significativa o un mantenimiento de la función muscular.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un médico especializado en atrofia muscular espinal, o en consulta con este
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EXKIVITY
Nombres del medicamento	EXKIVITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	EXSERVAN
Nombres del medicamento	EXSERVAN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente tiene dificultad para tragar formas farmacéuticas orales sólidas (por ejemplo, comprimidos).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	EYLEA
Nombres del medicamento	EYLEA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	EYLEA HD
Nombres del medicamento	EYLEA HD
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	FABIOR
Nombres del medicamento	FABIOR, TAZAROTENE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FABRAZYME
Nombres del medicamento	FABRAZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de enfermedad de Fabry, paciente cumple CUALQUIERA de los requisitos siguientes: 1) el diagnóstico de la enfermedad de Fabry se ha confirmado mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática alfa-galactosidasa o mediante pruebas genéticas O 2) el paciente es portador obligado sintomático.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FANAPT
Nombres del medicamento	FANAPT, FANAPT TITRATION PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la esquizofrenia: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, lurasidona, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona, Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos de marca: Caplyta, Rexulti, Secuado, Vraylar.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FASENRA
Nombres del medicamento	FASENRA, FASENRA PEN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Asma grave, tratamiento inicial: 1) O bien a) El paciente tiene un recuento inicial de eosinófilos en sangre de al menos 150 células por microlitro, O bien b) El paciente depende de corticosteroides sistémicos, y 2) El paciente tiene antecedentes de asma grave a pesar del tratamiento actual con ambos de los siguientes medicamentos: a) corticosteroide inhalado de dosis media a alta y b) controlador adicional (es decir, agonista beta2 de acción prolongada, antagonista muscarínico de acción prolongada, modificador de leucotrienos o teofilina de liberación sostenida), a menos que el paciente presente intolerancia o tiene una contraindicación a dichos tratamientos. Asma grave, continuación del tratamiento: El control del asma ha mejorado con el tratamiento con el medicamento solicitado, como lo demuestra la reducción de la frecuencia y/o gravedad de los síntomas y exacerbaciones o la reducción de la dosis diaria de corticosteroides orales de mantenimiento.
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FEBUXOSTAT
Nombres del medicamento	FEBUXOSTAT, ULORIC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FENSOLVI
Nombres del medicamento	FENSOLVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica necesaria	En caso de pubertad precoz central (CPP): Los pacientes que no estén recibiendo tratamiento en la actualidad deben cumplir todos los criterios siguientes: 1) El diagnóstico de CPP se confirmó mediante una respuesta puberal a una prueba con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) O un nivel puberal de un ensayo de hormona luteinizante (LH) de tercera generación, Y 2) La evaluación de la edad ósea frente a la edad cronológica apoya el diagnóstico de CPP, Y 3) El inicio de las características sexuales secundarias se produjo antes de los 8 años de edad para las pacientes femeninas O antes de los 9 años de edad para los pacientes masculinos.
Restricciones de edad	CPP: El paciente debe tener menos de 12 años si es mujer y menos de 13 años si es hombre.
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FENTANYL PARCHE
Nombres del medicamento	FENTANYL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se receta para el dolor asociado al cáncer, la anemia falciforme, una enfermedad terminal o el dolor que se trata mediante cuidados paliativos O el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) El medicamento solicitado se receta para un dolor lo suficientemente intenso como para requerir un tratamiento diario, todo el día y a largo plazo en un paciente que ha estado tomando un opiáceo Y 2) El paciente puede tomar con seguridad la dosis solicitada basándose en su historial de consumo de opiáceos [Nota: Este medicamento sólo debe ser recetado por profesionales sanitarios con conocimientos en el uso de opioides potentes para el tratamiento del dolor crónico] Y 3) El paciente ha sido evaluado y será monitoreado por el desarrollo de trastorno por uso de opioides Y 4) Esta solicitud es para la continuación del tratamiento para un paciente que ha estado recibiendo un agente opioide de liberación prolongada durante al menos 30 días O el paciente ha tomado un opioide de liberación inmediata durante al menos una semana.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FERRIPROX
Nombres del medicamento	DEFERIPRONE, FERRIPROX, FERRIPROX TWICE-A-DAY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	La sobrecarga transfusional de hierro del paciente no se debe a un síndrome mielodisplásico ni a una anemia de Diamond Blackfan.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FETZIMA
Nombres del medicamento	FETZIMA, FETZIMA TITRATION PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el trastorno depresivo mayor (MDD): El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes: inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), mirtazapina, bupropión.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FILSPARI
Nombres del medicamento	FILSPARI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la reducción de la proteinuria en pacientes con nefropatía primaria por inmunoglobulina A (IgAN) con riesgo de evolución rápida de la enfermedad: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento con una dosis máxima tolerada de un inhibidor del sistema renina-angiotensina (SRA) (por ejemplo, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina [ECA] o bloqueador de los receptores de angiotensina [BRA]) O 2) El paciente experimentó una intolerancia o tiene una contraindicación a los inhibidores del SRA.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FINTEPLA
Nombres del medicamento	FINTEPLA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FIRDAPSE
Nombres del medicamento	FIRDAPSE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Antecedentes de convulsiones
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FIRMAGON
Nombres del medicamento	FIRMAGON
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FLEQSUVY
Nombres del medicamento	BACLOFEN, FLEQSUVY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente es incapaz de tomar formas sólidas de dosificación oral (por ejemplo, dificultad para tragar comprimidos o cápsulas, necesita su administración mediante una sonda de alimentación).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FLUCYTOSINE
Nombres del medicamento	ANCOBON, FLUCYTOSINE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 semanas
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FOLOTYN
Nombres del medicamento	FOLOTYN, PRALATREXATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Micosis fungoide, síndrome de Sezary, leucemia/linfoma de células T del adulto (ATLL), linfoma extraganglionar de células T/natural killer (NK), linfoma hepatoesplénico de células T, linfoma anaplásico cutáneo de células grandes, tratamiento paliativo inicial del linfoma periférico de células T, linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FORTEO
Nombres del medicamento	FORTEO, TERIPARATIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de osteoporosis posmenopáusica, la paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) antecedentes de fractura por fragilidad, O 2) puntuación T pretratamiento inferior o igual a -2.5 o puntuación T pretratamiento superior a -2.5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura (FRAX) Y el paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) indicadores de mayor riesgo de fractura (por ejemplo, edad avanzada, fragilidad, tratamiento con glucocorticoides, puntuaciones T muy bajas o mayor riesgo de caídas), o b) el paciente no respondió a un tratamiento previo con un tratamiento inyectable para la osteoporosis o no lo tolera, o c) el paciente ha sido sometido a un ensayo con bifosfonatos orales de al menos 1 año de duración o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral. En caso de osteoporosis primaria o hipogonadal en hombres: el paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) antecedentes de fractura vertebral o de cadera osteoporótica, O 2) puntuación T pretratamiento inferior o igual a -2.5 o puntuación T pretratamiento superior a -2.5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de acuerdo a FRAX, Y el paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) el paciente no respondió a un tratamiento previo con un tratamiento inyectable para la osteoporosis o no lo tolera, o b) el paciente ha probado bifosfonatos orales por lo menos durante un 1 año o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 24 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	En caso de osteoporosis inducida por glucocorticoides: El paciente probó bifosfonato oral por lo menos durante un 1 año, a menos que tenga una contraindicación o intolerancia a un bifosfonato oral, Y el paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: 1) el paciente tiene antecedentes de fractura por fragilidad, O 2) una puntuación T previa al tratamiento inferior o igual a -2,5, O 3) una puntuación T previa al tratamiento superior a -2,5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura FRAX previa al tratamiento. Continuación del tratamiento: Si el paciente ha recibido un tratamiento igual o superior a 24 meses con cualquier análogo de la hormona paratiroidea: 1) El paciente sigue teniendo o ha vuelto a tener un alto riesgo de fractura, Y 2) El beneficio del tratamiento con este medicamento recetado supera los riesgos potenciales para este paciente.

Grupo de autorización previa	FOTIVDA
Nombres del medicamento	FOTIVDA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el carcinoma avanzado de células renales: deben cumplirse los siguientes criterios: 1) La enfermedad es recidivante o refractaria, 2) El medicamento solicitado debe utilizarse después de al menos dos tratamientos sistémicos previos, y 3) El paciente ha experimentado una evolución de la enfermedad o una reacción adversa intolerable con una prueba de Cabometyx (cabozantinib).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RUZAQLA
Nombres del medicamento	RUZAQLA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	FYARRO
Nombres del medicamento	FYARRO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	FYCOMPA
Nombres del medicamento	FYCOMPA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una de las siguientes contraindicaciones: Aptiom, Xcopri, Spritam. Para el tratamiento complementario de convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene contraindicado el medicamento Spritam.
Restricciones de edad	Convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 4 años de edad o más. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias: 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GALAFOLD
Nombres del medicamento	GALAFOLD
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	GATTEX
Nombres del medicamento	GATTEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para síndrome del intestino corto (SBS) tratamiento inicial: 1) Si la solicitud es para un paciente adulto, el paciente ha sido dependiente de soporte parenteral durante al menos 12 meses O 2) Si la solicitud es para un paciente pediátrico, el paciente es dependiente de soporte parenteral. En caso de continuación de SBS: La necesidad de soporte parenteral ha disminuido con respecto al valor inicial durante el tratamiento con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un gastroenterólogo, cirujano gastrointestinal o especialista en apoyo nutricional, o en consulta con ellos.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GAVRETO
Nombres del medicamento	GAVRETO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico recidivante positivo al reordenamiento durante la transfección (RET)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el carcinoma pulmonar no microcítico, el paciente debe cumplir todos los requisitos siguientes: 1) la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica Y 2) el tumor es reordenado recurrente positivo durante la transfección (RET) o reordenado positivo RET.
Restricciones de edad	Carcinoma pulmonar no microcítico: 18 años de edad o más. Cáncer medular de tiroides y cáncer de tiroides: 12 años de edad o más.
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	GAZYVA
Nombres del medicamento	GAZYVA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma linfocítico pequeño (SLL), linfoma MALT gástrico, linfoma MALT no gástrico, linfoma de la zona marginal ganglionar, linfoma de la zona marginal esplénica, transformación histológica de linfoma de la zona marginal a linfoma difuso de células B grandes, linfoma de células del manto, linfoma difuso de células B grandes, linfomas de células B de alto grado, linfoma de Burkitt, linfomas de células B relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), trastornos linfoproliferativos postrasplante, enfermedad de Castleman.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todos los diagnósticos: la enfermedad es CD20-positiva. Para linfoma MALT gástrico, linfoma MALT no gástrico, linfoma de la zona marginal ganglionar y linfoma de la zona marginal esplénica: el medicamento solicitado se utiliza en cualquiera de los siguientes contextos: 1) tratamiento de segunda línea o subsiguiente, o 2) tratamiento de mantenimiento, o 3) sustituto del rituximab en un paciente que haya experimentado intolerancia o una complicación poco frecuente (por ejemplo, reacción mucocutánea) al rituximab, o 4) tratamiento de primera línea (indicación exclusiva para linfoma de la zona marginal ganglionar). En caso de transformación histológica de linfoma de la zona marginal a linfoma difuso de células B grandes, linfoma de células del manto, linfoma difuso de células B grandes, linfomas de células B de alto grado, linfoma de Burkitt, linfomas de células B relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), trastornos linfoproliferativos postrasplante y enfermedad de Castleman: el paciente ha experimentado una intolerancia o una complicación rara (por ejemplo, reacción mucocutánea) al rituximab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GILENYA
Nombres del medicamento	FINGOLIMOD, GILENYA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	GILOTRIF
Nombres del medicamento	GILOTRIF
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) El paciente tiene un NSCLC escamoso metastásico que progresó tras la quimioterapia basada en platino, O 2) El paciente tiene una enfermedad sensibilizante con mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GIMOTI
Nombres del medicamento	GIMOTI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente no utilizará el medicamento solicitado durante más de 12 semanas consecutivas de tratamiento Y El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la metoclopramida oral O El paciente no puede tomar metoclopramida oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GIVLAARI
Nombres del medicamento	GIVLAARI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	GLATIRAMER
Nombres del medicamento	COPAXONE, GLATIRAMER ACETATE, GLATOPA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GOCOVRI
Nombres del medicamento	GOCOVRI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GONADOTROPINA
Nombres del medicamento	CHORIONIC GONADOTROPIN, NOVAREL, PREGNYL W/DILUENT BENZYL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Inducción de la ovulación
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	GRALISE
Nombres del medicamento	GABAPENTIN, GRALISE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Neuralgia postherpética: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la gabapentina de liberación inmediata
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	GRASTEK
Nombres del medicamento	GRASTEK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Asma grave, inestable o no controlada. Antecedentes de cualquier reacción alérgica sistémica grave o cualquier reacción local grave a la inmunoterapia sublingual con alérgenos. Antecedentes de esofagitis eosinofílica.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Entre 5 y 65 años de edad
Restricciones del recetador	Recetado por un alergista o inmunólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	HORMONA DEL CRECIMIENTO
Nombres del medicamento	GENOTROPIN, GENOTROPIN MINISQUICK, HUMATROPE, NORDITROPIN FLEXPOR, NUTROPIN AQ NUSPIN 10, NUTROPIN AQ NUSPIN 20, NUTROPIN AQ NUSPIN 5, OMNITROPE, ZOMACTON
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Pacientes pediátricos con epífisis cerrada
Información médica requerida	Deficiencia de hormona de crecimiento pediátrica (GHD): El paciente (pt) es un neonato o fue diagnosticado de GHD cuando era neonato O cumple alguno de los siguientes requisitos: 1) menor de 2.5 años (yo) con altura (HT) antes del tratamiento (pretratamiento) más de 2 desviaciones estándar (SD) por debajo de la media y velocidad de crecimiento lenta O 2) 2.5 años o más Y uno de los siguientes: a) velocidad de HT 1 año pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media O b) pretratamiento de ht de más de 2 SD por debajo de la media y velocidad de ht 1 año más de 1 SD por debajo de la media, Y el paciente cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) falló con 2 pruebas de estimulación de la hormona del crecimiento (GH) pretratamiento (pico inferior a 10 ng/mL), O 2) trastorno hipofisario/del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, defectos genéticos, anomalías estructurales adquiridas, anomalías estructurales congénitas) y factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media. Síndrome de Turner (TS): 1) Confirmado por cariotipo Y 2) altura pretratamiento es inferior al percentil 5 para la edad. Pequeño para la edad gestacional (SGA): 1) Peso al nacer inferior a 2.500 g a una edad gestacional superior a 37 semanas, O peso o talla al nacer por debajo del percentil 3 para la edad gestacional o al menos 2 SD por debajo de la media para la edad gestacional, Y 2) no manifestaron un crecimiento de recuperación a los 2 años. SGA: 2 años de edad o más
Restricciones de edad	SGA: 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo, nefrólogo, especialista en enfermedades infecciosas, gastroenterólogo/especialista en apoyo nutricional o geneticista, o endocrinólogo, o en consulta con ellos.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	GHD en adultos: El paciente cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) falló en 2 pruebas de estimulación de GH pretratamiento, O 2) IGF-1 pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media Y 1 prueba de estimulación de GH pretratamiento fallida. (Nota: Las pruebas de estimulación incluyen: a) prueba de tolerancia a la insulina [ITT] [nivel máximo de GH inferior o igual a 5 ng/ml], o b) prueba de estimulación con Macrilen [nivel máximo de GH inferior a 2.8 ng/ml], o c) prueba de estimulación con glucagón [GST] [nivel máximo de GH inferior o igual a 3 ng/ml] para pacientes con un índice de masa corporal [BMI] de 25-30 kg/m ² y alta probabilidad previa a la prueba de GHD [p. ej., anomalías estructurales adquiridas] o un BMI inferior a 25 kg/m ² , anomalías estructurales adquiridas] o BMI inferior a 25 kg/m ² , o d) GST [nivel máximo de GH inferior o igual a 1 ng/ml] en pacientes con BMI 25-30 kg/m ² y baja probabilidad previa a la prueba de GHD o BMI superior a 30 kg/m ² , O 3) enfermedad hipotalámica-hipofisaria orgánica (p.ej., masa supraselar con cirugía previa e irradiación craneal) con 3 o más deficiencias hormonales hipofisarias, E IGF-1 pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media, O 4) defectos hipotalámico-hipofisarios genéticos o estructurales, O 5) GHD de inicio en la infancia con anomalía congénita (genética o estructural) del hipotálamo/hipófisis/CNS. Renovación para GHD pediátrico, TS, SGA y GHD adulto: El paciente experimenta mejoría.

Grupo de autorización previa	HAEGARDA
Nombres del medicamento	HAEGARDA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de prevención de crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes requisitos: 1) el paciente padece angioedema hereditario (HAE) con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece angioedema hereditario con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	HARVONI
Nombres del medicamento	HARVONI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para virus de la hepatitis C (HCV): Infección confirmada por la presencia de HCV RNA en suero antes de iniciar el tratamiento. Régimen de tratamiento previsto, genotipo, antecedentes de tratamiento previo, presencia o ausencia de cirrosis (compensada o descompensada [Child Turcotte Pugh clase B o C]), presencia o ausencia de coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), presencia o ausencia de sustituciones asociadas a resistencia cuando proceda, estado del trasplante si procede. Las condiciones de cobertura y la duración específica de la autorización se basarán en las directrices de tratamiento vigentes de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (AASLD-IDSA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Los criterios se aplican de acuerdo con las directrices actuales de AASLD-IDSA. Recordatorio para la opción de 8 semanas si procede.
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	HEMADY
Nombres del medicamento	HEMADY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	HERCEPTIN
Nombres del medicamento	HERCEPTIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, del cáncer de mama con HER2 positivo recidivante o avanzado irresecable, de metástasis leptomeningeas del cáncer de mama con HER2 positivo, de metástasis cerebrales del cáncer de mama con HER2 positivo, del adenocarcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica con HER2 positivo, del carcinoma uterino seroso avanzado, recidivante o metastásico con HER2-positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumor recidivante de glándulas salivales con HER2 positivo, carcinoma hepatobiliar no resecable o metastásico con HER2-positivo (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático), adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o recidivante con sobreexpresión HER2 positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente presentó una reacción adversa intolerable a Trazimera y dicha reacción adversa NO se atribuyó al principio activo tal y como se describe en la información de la receta. Para cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF no mutados (WT) y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab, tucatinib o lapatinib y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para carcinoma hepatobiliar: 1) la enfermedad es HER2-positiva Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	HERCEPTIN HYLECTA
Nombres del medicamento	HERCEPTIN HYLECTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neocomplementario del cáncer de mama positivo para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2), cáncer de mama no resecable recidivante o avanzado con HER2 positivo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	HERZUMA
Nombres del medicamento	HERZUMA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neocomplementario del cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, del cáncer de mama con HER2 positivo recidivante o avanzado irresecable, de metástasis leptomeníngicas del cáncer de mama con HER2 positivo, de metástasis cerebrales del cáncer de mama con HER2 positivo, del adenocarcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica con HER2 positivo, del carcinoma uterino seroso avanzado, recidivante o metastásico con HER2-positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumor recidivante de glándulas salivales con HER2 positivo, carcinoma hepatobiliar no resecable o metastásico con HER2-positivo (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático), adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o recidivante con sobreexpresión HER2 positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente presentó una reacción adversa intolerable a Trazimera y dicha reacción adversa NO se atribuyó al principio activo tal y como se describe en la información de la receta. Para cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF no mutados (WT) y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab, tucatinib o lapatinib y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para carcinoma hepatobiliar: 1) la enfermedad es HER2-positiva Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	HETLIOZ
Nombres del medicamento	HETLIOZ, TASIMELTEON
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el trastorno del sueño sin 24 horas de vigilia: 1) Para el tratamiento inicial y la continuación del tratamiento, el paciente debe cumplir los dos criterios siguientes: a) diagnóstico de ceguera total en ambos ojos (por ejemplo, retinas no funcionales) y b) incapacidad para percibir la luz en cualquiera de los ojos, Y 2) Si actualmente está en tratamiento con el medicamento solicitado, el paciente debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: a) aumento del sueño nocturno total o b) disminución de la duración de la siesta diurna. Para los trastornos del sueño nocturno en el síndrome de Smith-Magenis (SMS): 1) Para el tratamiento inicial y el tratamiento de continuación, el paciente tiene un diagnóstico confirmado de SMS Y 2) Si actualmente está en tratamiento con el medicamento solicitado, el paciente experimentó una mejora en la calidad del sueño desde el inicio del tratamiento.
Restricciones de edad	No 24: 18 años de edad o más. SMS: 16 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en trastornos del sueño, neurólogo o psiquiatra, o en consulta con ellos.
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; renovación: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	HETLIOZ LQ
Nombres del medicamento	HETLIOZ LQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para los trastornos del sueño nocturno en el síndrome de Smith-Magenis (SMS): 1) Para el tratamiento inicial y el tratamiento de continuación, el paciente tiene un diagnóstico confirmado de SMS Y 2) Si actualmente está en tratamiento con el medicamento solicitado, el paciente experimentó una mejora en la calidad del sueño desde el inicio del tratamiento.
Restricciones de edad	Entre 3 y 15 años de edad
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en trastornos del sueño o neurólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; renovación: año del plan.
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MEDICAMENTO DE ALTO RIESGO
Nombres del medicamento	KETOROLAC TROMETHAMINE, PERPHENAZINE/AMITRIPTYLIN, PROMETHAZINE VC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).
Grupo de autorización previa	HIZENTRA
Nombres del medicamento	HIZENTRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	HORIZANT
Nombres del medicamento	HORIZANT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Síndrome de piernas inquietas: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al pramipexole de liberación inmediata o al ropinirole de liberación inmediata. Neuralgia postherpética: El paciente ha experimentado una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a la gabapentina de liberación inmediata.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	HRM-ANTICONVULSIVOS
Nombres del medicamento	PHENOBARBITAL, PHENOBARBITAL SODIUM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Epilepsia.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Este requisito de Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).
Grupo de autorización previa	HRM-ANTIPARKINSON
Nombres del medicamento	BENZTROPINE MESYLATE, TRIHEXYPHENIDYL HCL, TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. EPS (síntomas extrapiramidales): 1) El paciente no ha probado el medicamento alternativo no-HRM amantadina Y 2) El paciente tiene una contraindicación al medicamento alternativo no-HRM amantadina O 3) El paciente ha probado el medicamento alternativo no-HRM amantadina Y 4) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia al medicamento alternativo no-HRM amantadina. Parkinson: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: amantadina, carbidopa/levodopa, pramipexol o ropinirol. Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: amantadina, carbidopa/levodopa, pramipexol o ropinirol.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-CARBINOXAMINE-DEXCHLOPHENIRAMINE
Nombres del medicamento	CARBINOXAMINE MALEATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Para rinitis: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).
Grupo de autorización previa	HRM-CLEMASTINE
Nombres del medicamento	CLEMASTINE FUMARATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Para rinitis: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-CYPROHEPTADINE
Nombres del medicamento	CYPROHEPTADINE HCL, CYPROHEPTADINE HYDROCHLOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Prurito, espasticidad debida a lesión medular
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Para rinitis: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).
Grupo de autorización previa	HRM-DIPYRIDAMOLE
Nombres del medicamento	DIPYRIDAMOLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-GUANFACINE ER
Nombres del medicamento	GUANFACINE ER, GUANFACINE HYDROCHLORIDE, INTUNIV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).
Grupo de autorización previa	HRM-GUANFACINE IR
Nombres del medicamento	GUANFACINE HYDROCHLORIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-HYDROXYZINE
Nombres del medicamento	HYDROXYZINE HCL, HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE, HYDROXYZINE PAMOATE, VISTARIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para ansiedad: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos: buspirona, duloxetina, escitalopram, sertralina o venlafaxina de liberación prolongada Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos: buspirona, duloxetina, escitalopram, sertralina o venlafaxina de liberación prolongada O 3) El paciente no ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos: buspirona, duloxetina, escitalopram, sertralina o venlafaxina de liberación prolongada Y 4) El paciente presenta ansiedad aguda. Para todas las indicaciones: 1) El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Y 2) Si el paciente está tomando uno o más medicamentos anticolinérgicos adicionales (por ejemplo, oxibutinina, meclizina, paroxetina, amitriptilina, dicitlomina, ciclobenzaprina) con el medicamento solicitado, el médico recetante ha determinado que tomar múltiples medicamentos anticolinérgicos es médicamente necesario para el paciente [Nota: El uso de múltiples medicamentos anticolinérgicos en adultos mayores se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo].
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriatría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-HYDROXYZINE INJ
Nombres del medicamento	HYDROXYZINE HCL, HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Para el síndrome de abstinencia alcohólica: 1) El paciente no ha probado uno de los siguientes medicamentos alternativos: clorazepate o lorazepam, Y 2) El paciente tiene una contraindicación a uno de los siguientes medicamentos alternativos: clorazepate o lorazepam, O 3) El paciente ha probado uno de los siguientes medicamentos alternativos: clorazepate o lorazepam, Y 4) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a uno de los siguientes medicamentos alternativos. Para ansiedad: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos: buspirona, duloxetina, escitalopram, sertralina o venlafaxina de liberación prolongada Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos: buspirona, duloxetina, escitalopram, sertralina o venlafaxina de liberación prolongada O 3) El paciente no ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos: buspirona, duloxetina, escitalopram, sertralina o venlafaxina de liberación prolongada Y 4) El paciente presenta ansiedad aguda.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-HINÓPTICOS
Nombres del medicamento	AMBIEN, AMBIEN CR, EDLUAR, ESZOPICLONE, LUNESTA, ZALEPLON, ZOLPIDEM TARTRATE, ZOLPIDEM TARTRATE ER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para insomnio: 1) El paciente cumple uno de los siguientes criterios: a) el paciente tiene una contraindicación para el medicamento alternativo doxepina (3 mg o 6 mg) no HRM (medicamento de no alto riesgo), O b) se ha probado el medicamento alternativo doxepina (3 mg o 6 mg) no HRM (medicamento de no alto riesgo) Y el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia al medicamento alternativo doxepina (3 mg o 6 mg) no HRM (medicamento de no alto riesgo) doxepina (3 mg o 6 mg), Y 2) El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con este medicamento recetado supera los riesgos potenciales para este paciente Y 3) Si el paciente está utilizando dos o más medicaciones adicionales activas del sistema nervioso central (CNS) (por ej., lorazepam, quetiapina, sertralina, clonazepam, escitalopram, alprazolam) con el medicamento solicitado, el médico recetante ha determinado que tomar múltiples medicamentos activos del sistema nervioso central (CNS) es médicamente necesario para el paciente [Nota: El uso de múltiples medicamentos activos del sistema nervioso central (CNS) en adultos mayores se asocia con un mayor riesgo de caídas].
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). Se aplica al mayor de 90 días acumulativos de terapia al año.
Grupo de autorización previa	HRM-METHSCOPOLAMINE
Nombres del medicamento	METHSCOPOLAMINE BROMIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-PROMETHAZINE
Nombres del medicamento	PHENERGAN, PROMETHAZINE HCL, PROMETHAZINE HYDROCHLORID, PROMETHEGAN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Para rinitis: 1) El paciente ha probado dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento O intolerancia a dos de los siguientes medicamentos alternativos no-HRM: levocetirizina, azelastina nasal, fluticasona nasal o flunisolida nasal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).
Grupo de autorización previa	HRM-SCOPOLAMINE
Nombres del medicamento	SCOPOLAMINE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Salivación excesiva
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátría identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado).

Grupo de autorización previa	HRM-RELAJANTES DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
Nombres del medicamento	CARISOPRODOL, CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLO, METAXALONE, METHOCARBAMOL, SOMA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	1) El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. Y 2) Si el paciente está usando uno o más medicamentos anticolinérgicos adicionales (por ejemplo, oxibutinina, meclizina, paroxetina, amitriptilina, diciclomina, hidroxizina) con el medicamento solicitado, el médico recetante ha determinado que tomar múltiples medicamentos anticolinérgicos es médicamente necesario para el paciente [Nota: El uso de múltiples medicamentos anticolinérgicos en adultos mayores se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo].
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	3 meses
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 70 años de edad o mayores. (La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). La autorización previa se aplica al mayor de 30 días acumulativos de tratamiento al año.

Grupo de autorización previa	HUMIRA
Nombres del medicamento	HUMIRA, HUMIRA PEDIATRIC CROHNS D, HUMIRA PEN, HUMIRA PEN-CD/UC/HS START, HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC S, HUMIRA PEN-PS/UV STARTER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al metotrexato (MTX) o 2) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. En caso de espondilitis anquilosante activa y la espondiloartritis axial radiográfica (sólo en nuevos comienzos): el paciente presentó una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) O el paciente tiene una contraindicación que prohibiría probar con NSAID. En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% del BSA o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	En caso de panuveítis intermedia, posterior y panuveítis no infecciosa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a un corticosteroide O 2) el paciente tiene una contraindicación que prohibiría probar con corticosteroides.
Grupo de autorización previa	HYFTOR
Nombres del medicamento	HYFTOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	HYPNOTIC BENZODIAZEPINES
Nombres del medicamento	ESTAZOLAM, HALCION, TRIAZOLAM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de insomnio a corto plazo: 1) El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con este medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. (Nota: La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al doxepin (3 mg o 6 mg).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores. Se aplica al mayor de 90 días acumulativos de terapia al año.
Grupo de autorización previa	HYQVIA
Nombres del medicamento	HYQVIA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	IBRANCE
Nombres del medicamento	IBRANCE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Liposarcoma bien diferenciado/desdiferenciado irreseccable del retroperitoneo, cáncer de mama recidivante receptor hormonal positivo receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2)-negativo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ICATIBANT
Nombres del medicamento	ICATIBANT ACETATE, SAJAZIR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el paciente padece HAE con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece HAE con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ICLUSIG
Nombres del medicamento	ICLUSIG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Neoplasias mieloides y/o linfoides con eosinofilia y reordenamiento FGFR1 o ABL1 en fase crónica o blástica.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la leucemia mieloide crónica (CML), incluidos los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: 1) el paciente tiene CLM en fase acelerada o blástica y no está indicado ningún otro inhibidor de la cinasa, O 2) el paciente tiene CLM en fase crónica y ha experimentado resistencia o intolerancia a por lo menos 2 inhibidores de la cinasa previos, Y al menos uno de ellos era imatinib o dasatinib, O 3) el paciente es positivo para la mutación T315I. En caso de leucemia linfoblástica aguda (ALL), incluidos los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: el diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IDACIO
Nombres del medicamento	ADALIMUMAB-AACF (2 PEN), IDACIO (2 PEN), IDACIO (2 SYRINGE), IDACIO STARTER PACKAGE FO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al metotrexato (MTX) o 2) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. En caso de espondilitis anquilosante activa y la espondiloartritis axial radiográfica (sólo en nuevos comienzos): el paciente presentó una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) O el paciente tiene una contraindicación que prohibiría probar con NSAID. En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% del BSA o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	En caso de panuveítis intermedia, posterior y panuveítis no infecciosa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a un corticosteroide O 2) el paciente tiene una contraindicación que prohibiría probar con corticosteroides.

Grupo de autorización previa	IDHIFA
Nombres del medicamento	IDHIFA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia mieloide aguda recién diagnosticada
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide aguda (AML) con mutación en los genes de la enzima isocitrato deshidrogenasa-2 (IDH2): 1) el paciente tiene 60 años o más con AML recién diagnosticada y cumple uno de los siguientes criterios: a) no es candidato a tratamiento intensivo de inducción, o b) rechaza la quimioterapia intensiva de inducción, O 2) tiene 60 años o más y el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de postinducción tras la respuesta al tratamiento de inducción con el medicamento solicitado, O 3) el paciente tiene AML en recaída o refractaria.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ILARIS
Nombres del medicamento	ILARIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis idiopática juvenil sistémica activa o la enfermedad de Still de inicio en la edad adulta activa (sólo para nuevos tratamientos), el paciente debe cumplir alguno de los siguientes criterios: 1) una respuesta inadecuada a un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID), un corticosteroide, metotrexato o leflunomida, O 2) respuesta inadecuada o intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo. Para los ataques de gota, el paciente debe cumplir todo lo siguiente (nuevos comienzos): 1) dos o más ataques de gota en los 12 meses anteriores al tratamiento inicial con el medicamento solicitado, Y 2) respuesta inadecuada, intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos dos de los siguientes: antiinflamatorios no esteroideos (NSAID), colchicina o corticosteroides. Para los ataques de gota (continuación): el paciente experimentó una respuesta clínica positiva al tratamiento con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IMATINIB
Nombres del medicamento	GLEEVEC, IMATINIB MESYLATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumores desmoides, sinovitis villonodular pigmentada/tumor tenosinovial de células gigantes (PVNS/TGCT), cordoma recurrente, melanoma, sarcoma de Kaposi, enfermedad de injerto contra huésped crónica (cGVHD), leucemia linfoblástica aguda de células T con translocación de clase ABL, mastocitosis sistémica agresiva para la mastocitosis sistémica bien diferenciada (WDSM) o cuando hay eosinofilia con gen de fusión FIP1L1-PDGFR A, neoplasias mieloides y/o linfoides con eosinofilia y reordenamiento ABL1, FIP1L1-PDGFR A o PDGFR B en la fase crónica o blástica
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide crónica (CML) Para la leucemia linfoblástica aguda Philadelphia positivo (Ph+ ALL), incluidos los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: el diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Philadelphia o del gen BCR-ABL. En caso de CML: el paciente no ha fracasado (se excluye el fracaso debido a intolerancia) en el tratamiento previo con un inhibidor de la tirosina cinasa. Para melanoma: la mutación c-Kit es positiva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IMBRUVICA
Nombres del medicamento	IMBRUVICA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera del indicado en la etiqueta	Leucemia de células pilosas, linfoma linfoplasmocítico, linfoma primario del sistema nervioso central (CNS), linfoma de células B relacionado con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), linfoma difuso de células B grandes, trastornos linfoproliferativos postrasplante, linfoma de células B de alto grado, linfoma de células del manto, linfoma de la zona marginal (incluido el linfoma de la zona marginal extraganglionar del estómago, el linfoma de la zona marginal extraganglionar de localizaciones no gástricas, el linfoma de la zona marginal ganglionar, el linfoma de la zona marginal esplénica)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para linfoma de células del manto: 1) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de segunda línea o posterior, O 2) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con rituximab como tratamiento previo al tratamiento de inducción con el régimen RHyperCVAD (rituximab, ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona), O 3) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento agresivo de inducción. Para linfoma de la zona marginal (lo que incluye linfoma de la zona marginal extraganglionar del estómago, linfoma de la zona marginal extraganglionar de los sitios no gástricos, linfoma de la zona marginal ganglionar y linfoma de la zona marginal esplénica): el medicamento solicitado será usado como tratamiento de segunda línea o posterior. En caso de leucemia de células pilosas: el medicamento solicitado se utilizará como agente único para la evolución de la enfermedad. Para linfoma primario del sistema nervioso central: 1) la enfermedad es recidivante o refractaria Y 2) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de inducción como agente único. Para el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma de células B de alto grado: el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de segunda línea o posterior. Para el linfoma de células B relacionado con el HIV: el medicamento solicitado se utilizará como agente único y como tratamiento de segunda línea o posterior para la enfermedad recidivante. Para trastornos linfoproliferativos postrasplante: el medicamento solicitado se utilizará en pacientes que hayan recibido quimioinmunoterapia previa.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IMFINZI
Nombres del medicamento	IMFINZI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico en estadio II irresecable, carcinoma hepatocelular metastásico
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma pulmonar no microcítico no resecable en estadio II y III: La enfermedad no ha progresado tras la quimioterapia con platino y la radioterapia concurrentes. Para los cánceres de las vías biliares: El paciente tiene enfermedad localmente avanzada, irresecable, recurrente o metastásica. Para el carcinoma hepatocelular: El paciente tiene enfermedad irresecable o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	IMJUDO
Nombres del medicamento	IMJUDO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	IMPAVIDO
Nombres del medicamento	IMPAVIDO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Embarazo. Síndrome de Sjogren-Larsson.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	28 días
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IMVEXXY
Nombres del medicamento	IMVEXXY MAINTENANCE PACK, IMVEXXY STARTER PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	INBRIJA
Nombres del medicamento	INBRIJA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento inicial de episodios "off" en la enfermedad de Parkinson: 1) El paciente está siendo tratado actualmente con carbidopa/levodopa oral, 2) El paciente no padece ninguna de las siguientes enfermedades: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD) u otra enfermedad pulmonar crónica subyacente. Para el tratamiento continuado de los episodios "off" en la enfermedad de Parkinson: El paciente experimenta mejoría con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	INCRELEX
Nombres del medicamento	INCRELEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Pacientes pediátricos con epífisis cerrada
Información médica requerida	En caso de fallas de crecimiento por deficiencia primaria grave del factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) o delección del gen de la hormona de crecimiento (GH) en pacientes que han desarrollado anticuerpos neutralizantes contra la GH, el paciente cumple con todos los criterios siguientes antes de comenzar la terapia con el medicamento solicitado (sólo para nuevos comienzos): 1) estatura 3 o más desviaciones estándar (SD) por debajo de la media de los niños de la misma edad y sexo Y 2) IGF-1 inicial de nivel 3 o más SD por debajo de la media de los niños de la misma edad y sexo Y 3) prueba de provocación de la hormona del crecimiento que muestre un nivel normal o elevado de la hormona del crecimiento. Para el fracaso del crecimiento debido a deficiencia primaria grave de IGF-1 o delección del gen de la GH en pacientes que han desarrollado anticuerpos neutralizantes contra la GH, continuación del tratamiento: el paciente experimenta mejoría.
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	INLYTA
Nombres del medicamento	INLYTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma de tiroides (papilar, de células de Hurthle o folicular), sarcoma alveolar de partes blandas
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma de células renales: La enfermedad está avanzada, en recaída o en estadio IV.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	INQOVI
Nombres del medicamento	INQOVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	INREBIC
Nombres del medicamento	INREBIC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamiento janus quinasa 2 (JAK2), mielofibrosis en fase acelerada, mielofibrosis en fase blástica/leucemia mieloide aguda
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamiento JAK2: la enfermedad está en fase crónica o blástica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	INTRAROSA
Nombres del medicamento	INTRAROSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IR BEFORE ER
Nombres del medicamento	HYDROCODONE BITARTRATE ER, HYDROMORPHONE HCL ER, HYDROMORPHONE HYDROCHLORI, HYSINGLA ER, METHADONE HCL, METHADONE HYDROCHLORIDE I, MORPHINE SULFATE ER, MS CONTIN, OXYCONTIN, TRAMADOL HCL ER, TRAMADOL HYDROCHLORIDE ER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se receta para el dolor asociado al cáncer, la anemia falciforme, una enfermedad terminal o el dolor que se trata mediante cuidados paliativos O el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) El medicamento solicitado se receta para un dolor lo suficientemente intenso como para requerir un tratamiento diario, todo el día y a largo plazo en un paciente que ha estado tomando un opiáceo Y 2) El paciente puede tomar con seguridad la dosis solicitada basándose en su historial de consumo de opiáceos [Nota: Este medicamento sólo debe ser recetado por profesionales sanitarios con conocimientos en el uso de opioides potentes para el tratamiento del dolor crónico] Y 3) El paciente ha sido evaluado y será monitoreado por el desarrollo de trastorno por uso de opioides Y 4) Esta solicitud es para la continuación del tratamiento para un paciente que ha estado recibiendo un agente opioide de liberación prolongada durante al menos 30 días O el paciente ha tomado un opioide de liberación inmediata durante al menos una semana.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	IRESSA
Nombres del medicamento	GEFITINIB, IRESSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Sensibilización del carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente con mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC: 1) la enfermedad debe ser metastásica, avanzada o recurrente y 2) el paciente debe tener una mutación EGFR sensibilizante.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ISOTRETINOIN
Nombres del medicamento	ABSORICA, ABSORICA LD, ACCUTANE, AMNESTEEM, CLARAVIS, ISOTRETINOIN, ZENATANE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Acné vulgar refractario, rosácea refractaria grave, neuroblastoma, linfoma cutáneo de células T (CTCL) (por ejemplo, micosis fungoide, síndrome de Sezary), alto riesgo de desarrollar cáncer de piel (cánceres de células escamosas), dermatosis acantolítica transitoria (enfermedad de Grover), queratosis folicular (enfermedad de Darier), ictiosis lamelar, pitiriasis rubra pilaris.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ISTURISA
Nombres del medicamento	ISTURISA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ITRACONAZOLE
Nombres del medicamento	ITRACONAZOLE, SPORANOX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Coccidiodomicosis, profilaxis de la coccidiodomicosis en la infección por HIV, criptococosis, microsporidiosis, talaromicosis (antes peniciliosis), profilaxis de la histoplasmosis en la infección por HIV, profilaxis de la infección fúngica invasiva en el trasplante de hígado, enfermedad granulomatosa crónica (CGD), neoplasias malignas hematológicas, esporotricosis, pitiriasis versicolor, tinea versicolor, tinea corporis, tinea cruris, tinea capitis, tinea manuum, tinea pedis, tratamiento primario de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, tratamiento primario de la aspergilosis pulmonar crónica cavitaria o subaguda invasiva (necrotizante)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará por vía oral. Para el tratamiento de la onicomicosis por dermatofitos (tinea unguium), el diagnóstico se ha confirmado mediante una prueba de diagnóstico fúngico (por ejemplo, preparación de hidróxido de potasio [KOH], cultivo fúngico o biopsia de la uña). Para el tratamiento primario de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el medicamento solicitado se inicia en combinación con corticosteroides sistémicos.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Histo/CNS diseminado, histo/CM/CGD ppx, AP crónica cavitaria/necrotizante: 12 meses. Otros: 6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	IVERMECTIN TAB
Nombres del medicamento	IVERMECTIN, STROMEKTOL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Ascariasis, larva migrans cutánea, mansonelliasis, sarna, gnathostomiasis, pediculosis
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado no está siendo recetado para la prevención o tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IVIG
Nombres del medicamento	BIVIGAM, FLEBOGAMMA DIF, GAMMAGARD LIQUID, GAMMAGARD S/D IGA LESS TH, GAMMAKED, GAMMAPLEX, GAMUNEX-C, OCTAGAM, PANZYGA, PRIVIGEN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de leucemia linfocítica crónica (CLL) de células B: 1) IgG sérica inferior a 500 mg/dL O 2) antecedentes de infecciones bacterianas recurrentes. Para trasplante de médula ósea/trasplante de células madre hematopoyéticas (BMT/HSCT): 1) se solicita IVIG en los primeros 100 días postrasplante O 2) IgG sérica inferior a 400 mg/dL. En caso de infección pediátrica por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV): 1) IgG sérica inferior a 400 mg/dL O 2) antecedentes de infecciones bacterianas recurrentes. En caso de dermatomiositis y la polimiositis: 1) se ha probado al menos un tratamiento estándar de primera línea (corticosteroide o inmunosupresor) pero no ha tenido éxito o no se ha tolerado O 2) el paciente no puede recibir el tratamiento estándar debido a una contraindicación u otra razón clínica. En caso de aplasia pura de células rojas (PRCA): La PRCA es secundaria a la infección por parvovirus B19.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	IWILFIN
Nombres del medicamento	IWILFIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	IZERVAY
Nombres del medicamento	IZERVAY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para atrofia geográfica (GA) secundaria a degeneración macular asociada con la edad (AMD): el paciente no ha recibido antes un tratamiento de 12 o más meses con el medicamento requerido en cada ojo afectado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	JAKAFI
Nombres del medicamento	JAKAFI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Mielofibrosis de bajo riesgo, mielofibrosis en fase acelerada, mielofibrosis en fase blástica/leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda (ALL), leucemia mielomonocítica crónica (CMML)-2, síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa (MDS/MPN) con neutrofilia, trombocitemia esencial y neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamiento JAK2.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para policitemia vera: el paciente respondió inadecuadamente o intolerancia a la terapia con interferón o hidroxiurea. En caso de leucemia linfoblástica aguda: el paciente presenta una mutación del factor 2 similar al receptor de citocinas (CRLF2) o una mutación asociada con la vía de activación de la cinasa Jano/los transductores de señal y activadores de transcripción (JAK/STAT) En caso de CMML-2: el medicamento solicitado se utiliza en combinación con un agente hipometilante. Para el síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa (SMD/NMP) con neutrofilia: el medicamento solicitado se utiliza como agente único o en combinación con un agente hipometilante. En caso de trombocitemia esencial: el paciente respondió inadecuadamente o pérdida de respuesta a la hidroxiurea, al tratamiento con interferón o la anagrelida. Para neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamiento JAK2: la enfermedad está en fase crónica o blástica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	JATENZO
Nombres del medicamento	JATENZO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de disforia de género: El paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	JAYPIRCA
Nombres del medicamento	JAYPIRCA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica necesaria	Para la leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico pequeño (LLC/LSL): El paciente cumple los dos criterios siguientes: 1) El paciente ha recibido tratamiento previo con uno de los siguientes: Imbruvica (ibrutinib), Brukinsa (zanubrutinib) o Calquence (acalabrutinib), Y 2) El paciente ha recibido tratamiento previo con un inhibidor del linfoma de células B 2 (BCL-2).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	JEMPERLI
Nombres del medicamento	JEMPERLI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para tumores sólidos y cáncer de endometrio: el paciente tiene enfermedad con deficiencia de reparación de emparejamientos erróneos (dMMR)/ inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	JEVTANA
Nombres del medicamento	JEVTANA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente tiene un diagnóstico de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	JOENJA
Nombres del medicamento	JOENJA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el síndrome de fosfoinositida 3-cinasa delta activada (APDS): el diagnóstico se confirmó mediante pruebas genéticas que demostraron una variante en PIK3CD o PIK3R1.
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	JUXTAPID
Nombres del medicamento	JUXTAPID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	<p>Para el inicio del tratamiento para tratar la hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH), el paciente (pt) debe cumplir con TODO lo siguiente: A) El diagnóstico de HoFH se confirmó mediante uno de los siguientes: 1) Pruebas genéticas para confirmar dos alelos mutantes en el receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLR), la apolipoproteína B (ApoB), la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) o el locus génico de la proteína adaptadora 1 del receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLRAP1) O</p> <p>2) Antecedentes de un colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) no tratado superior a 500 mg/dL o un LDL-C tratado superior a 300 mg/dL y cualquiera de las siguientes circunstancias a) Presencia de xantomas cutáneos o tendinosos antes de los 10 años de edad, o b) Un nivel de LDL-C no tratado mayor o igual a 190 mg/dL en ambos progenitores, que es consistente con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HeFH), Y B) Antes del inicio del tratamiento, el paciente está recibiendo actualmente tratamiento con una estatina de alta intensidad a una dosis máxima tolerada o a la dosis máxima aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), a menos que el paciente sea intolerante a las estatinas o tenga una contraindicación al tratamiento con estatinas, Y C) Antes de iniciar el tratamiento con el medicamento solicitado, el paciente estaba recibiendo tratamiento con un tratamiento dirigido a PCSK9 a una dosis máxima tolerada o a la dosis máxima aprobada por la FDA, a menos que haya experimentado una intolerancia o tenga una contraindicación a todos los tratamientos dirigidos a PCSK9, Y D) Antes del inicio del tratamiento, el paciente está/estaba experimentando una respuesta inadecuada al tratamiento hipolipemiente, según lo indicado por un LDL-C tratado superior a 100 mg/dL (o superior a 70 mg/dL con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica), Y E) El paciente continuará recibiendo tratamiento hipolipemiente concomitante. En caso de renovación del tratamiento de la HoFH: A) El paciente cumple todos los criterios iniciales, Y B) Ha respondido al tratamiento, como lo demuestra una reducción del LDL-C con respecto al valor inicial, Y C) Está recibiendo tratamiento hipolipemiente concomitante.</p>
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	JYNARQUE
Nombres del medicamento	JYNARQUE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KALBITOR
Nombres del medicamento	KALBITOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el paciente padece HAE con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece HAE con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KALYDECO
Nombres del medicamento	KALYDECO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para fibrosis quística (CF): El medicamento solicitado no se utilizará en combinación con otros medicamentos que contengan ivacaftor.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	KANJINTI
Nombres del medicamento	KANJINTI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neocomplementario del cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, del cáncer de mama con HER2 positivo recidivante o avanzado irresecable, de metástasis leptomeníngicas del cáncer de mama con HER2 positivo, de metástasis cerebrales del cáncer de mama con HER2 positivo, del adenocarcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica con HER2 positivo, del carcinoma uterino seroso avanzado, recidivante o metastásico con HER2-positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumor recidivante de glándulas salivales con HER2 positivo, carcinoma hepatobiliar no resecable o metastásico con HER2-positivo (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático), adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o recidivante con sobreexpresión HER2 positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente presentó una reacción adversa intolerable a Trazimera y dicha reacción adversa NO se atribuyó al principio activo tal y como se describe en la información de la receta. Para cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF no mutados (WT) y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab, tucatinib o lapatinib y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para carcinoma hepatobiliar: 1) la enfermedad es HER2-positiva Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	KANUMA
Nombres del medicamento	KANUMA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de deficiencia de lipasa ácida lisosomal: El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática de la lipasa ácida lisosomal o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	KETOCONAZOLE
Nombres del medicamento	KETOCONAZOLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera del indicado	Síndrome de Cushing
Criterios de exclusión	Enfermedad hepática aguda o crónica. Uso concomitante con medicamentos contraindicados con ketoconazol comprimidos: dofetilida, quinidina, pimozida, cisaprida, metadona, disopiramida, dronedarona, ranolazina, alcaloides del cornezuelo del centeno, irinotecán, lurasidona, midazolam oral, alprazolam, triazolam, felodipino, nisoldipino, tolvaptán, eplerenona, lovastatina, simvastatina o colchicina.
Información médica requerida	Los beneficios potenciales superan los riesgos del tratamiento con ketoconazol oral. Para las infecciones fúngicas sistémicas, el paciente tiene cualquiera de los siguientes diagnósticos: blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, cromomycosis o paracoccidioidomycosis. Para el síndrome de Cushing: el medicamento solicitado se receta a un paciente que no tolera la cirugía o en el que la cirugía no ha sido curativa.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KEVEYIS
Nombres del medicamento	DICHLORPHENAMIDE, KEVEYIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para parálisis periódica hipocaliémica primaria: 1) Los resultados de las pruebas genéticas apoyan el diagnóstico, O 2) El paciente tiene antecedentes familiares de parálisis periódica hipocaliémica primaria, O 3) Las crisis del paciente se asocian a hipocaliemia, Y se han descartado tanto el síndrome de Andersen-Tawil como la parálisis periódica tirotóxica. En caso de parálisis periódica HIPERcaliémica: 1) El diagnóstico ha sido apoyado por los resultados de pruebas genéticas, O 2) El paciente tiene antecedentes familiares de parálisis periódica hipercaliémica primaria, O 3) Las crisis del paciente están asociadas a hipercaliemia Y se ha descartado el síndrome de Andersen-Tawil. En caso de continuación del tratamiento de parálisis periódicas HIPOcalémica e HIPERcalémica primarias: El paciente está respondiendo al tratamiento con el medicamento solicitado, lo que se demuestra por una disminución del número o la gravedad de las crisis.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 2 meses. Continuación: 12 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	KEVEYIS
Nombres del medicamento	KEVZARA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha presentado una respuesta inadecuada al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al metotrexato (MTX) o 2) el paciente ha presentado una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. En caso de polimialgia reumática (PMR) (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente a los corticosteroides, O 2) el paciente ha presentado un brote de la enfermedad al intentar disminuir progresivamente los corticosteroides.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KEYTRUDA
Nombres del medicamento	KEYTRUDA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KIMMTRAK
Nombres del medicamento	KIMMTRAK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	KISQALI
Nombres del medicamento	KISQALI, KISQALI FEMARA 200 DOSE, KISQALI FEMARA 400 DOSE, KISQALI FEMARA 600 DOSE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama con receptor hormonal positivo y receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo, recidivante en combinación con un inhibidor de la aromatasas o fulvestrant.
Criterios de exclusión	- I n f o r m a c i ó n m é d i c a r e q u e r i d a - R e s t r i c c i o n e s d e

	d
	a
	d
	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KLISYRI
Nombres del medicamento	KLISYRI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a UNO de los siguientes: A) imiquimod crema al 5%, B) fluorouracilo crema o solución.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KORLYM
Nombres del medicamento	KORLYM, MIFEPRISTONE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	KOSELUGO
Nombres del medicamento	KOSELUGO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Fusión BRAF o mutación activadora en BRAF V600E positiva, astrocitoma pilocítico recurrente o progresivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	En caso de neurofibromatosis tipo 1: 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KRAZATI
Nombres del medicamento	KRAZATI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	KRYSTEXXA
Nombres del medicamento	KRYSTEXXA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado no se utilizará concomitantemente con agentes orales reductores de la orina. Para iniciar el tratamiento de la gota crónica: 1) el paciente debe cumplir uno de los siguientes requisitos: a) el paciente ha tenido una respuesta inadecuada a una prueba de tres meses con inhibidor de la xantina oxidasa a la dosis máxima médicamente apropiada, a menos que exista una razón clínica para no completar una prueba (por ejemplo, reacción alérgica grave, toxicidad, intolerancia, interacción farmacológica significativa, disfunción renal grave [sólo para alopurinol], insuficiencia renal terminal [sólo para febuxostat], o antecedentes de CVS o un nuevo evento CV [sólo para febuxostat]), o b) si existe un motivo clínico para no completar una prueba de 3 meses con un inhibidor de la xantina oxidasa, se requiere una respuesta inadecuada a una prueba de 3 meses con probenecid, a menos que exista un motivo clínico para no completar una prueba con probenecid (por ej.g., insuficiencia renal [tasa de filtración glomerular de 30 mL por minuto o menos], reacción alérgica grave, toxicidad, intolerancia, discrasias sanguíneas existentes o cálculos renales de ácido úrico, e interacción farmacológica significativa) Y 2) el paciente experimenta ataques frecuentes de gota (mayores o iguales a 2 por año) O el paciente tiene al menos 1 tofo de gota o artritis gotosa. Para continuación del tratamiento de gota crónica: 1) el paciente no ha tenido 2 niveles consecutivos de ácido úrico por encima de 6 mg/dL, Y 2) el paciente está experimentando beneficios de la terapia (por ejemplo, niveles séricos de ácido úrico inferiores a 6 mg/dL, reducción de tofos, reducción de síntomas y/o ataques).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	KYPROLIS
Nombres del medicamento	KYPROLIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	macroglobulinemia de Waldeström, linfoma linfoplasmocítico, amiloidosis sistémica de cadena ligera recidivante/refractaria
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LAMZEDE
Nombres del medicamento	LAMZEDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para manifestaciones de alfa-manosidosis no relacionadas con el sistema nervioso central: El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática alfa manosidasa o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LAPATINIB
Nombres del medicamento	LAPATINIB DITOSYLATE, TYKERB
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Metástasis cerebrales de cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, cáncer de mama con HER2 positivo recidivante, cordoma con receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) positivo recidivante, cáncer colorrectal con HER2 amplificado y con RAS y BRAF no mutados (incluido adenocarcinoma apendicular).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En el caso del cáncer de mama, el paciente cumple todos los criterios siguientes: a) la enfermedad es recidivante, avanzada o metastásica (incluidas las metástasis cerebrales), b) la enfermedad presenta receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, c) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con cualquiera de los siguientes: 1) inhibidor de la aromatasa, 2) capecitabina, O 3) trastuzumab. Para el cáncer colorrectal: 1) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con trastuzumab, y 2) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LENVIMA
Nombres del medicamento	LENVIMA 10 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 12 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 14 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 18 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 20 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 24 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 4 MG DOSIS DIARIA, LENVIMA 8 MG DOSIS DIARIA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma medular de tiroides, carcinoma endometrial recurrente, carcinoma tímico
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el cáncer diferenciado de tiroides (folicular, papilar o de células de Hurthle): enfermedad no susceptible de tratamiento con yodo radiactivo e irresecable, localmente recidivante, persistente o metastásica. Para el carcinoma hepatocelular: la enfermedad es irresecable o inoperable, local, metastásica o con carga tumoral hepática extensa. Para el carcinoma de células renales, la enfermedad está avanzada, en recaída o en estadio IV. Para carcinoma endometrial, el paciente cumple la TOTALIDAD de los criterios siguientes: 1) La enfermedad es avanzada, recurrente o metastásica, 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con pembrolizumab, 3) El paciente experimentó evolución de la enfermedad tras un tratamiento sistémico previo, Y 4) El paciente no es candidato a cirugía curativa ni radiación.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LEUKINE
Nombres del medicamento	LEUKINE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Profilaxis de la neutropenia febril (FN) inducida por quimioterapia, neutropenia en síndromes mielodisplásicos (MDS), neutropenia en anemia aplásica, neutropenia relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), neutropenia crónica grave (congénita, cíclica o idiopática).
Criterios de exclusión	Uso del producto solicitado dentro de las 24 horas previas o posteriores a la quimioterapia.
Información médica requerida	Para la profilaxis de la neutropenia febril (FN) inducida por quimioterapia, el paciente debe cumplir los dos criterios siguientes: 1) El paciente tiene un cáncer no mielóide, y 2) El paciente ha recibido, está recibiendo o recibirá tratamiento mielosupresor contra el cáncer.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LEUPROLIDE
Nombres del medicamento	LEUPROLIDE ACETATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Usar en combinación con la hormona del crecimiento en niños con retraso del crecimiento y pubertad avanzada, tumores de glándulas salivales con receptores androgénicos positivos recurrentes, pubertad precoz central.
Criterios de exclusión	-
Información médica necesaria	En caso de pubertad precoz central (CPP): Los pacientes que no estén recibiendo tratamiento en la actualidad deben cumplir todos los criterios siguientes: 1) El diagnóstico de CPP se confirmó mediante una respuesta puberal a una prueba con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) O un nivel puberal de un ensayo de hormona luteinizante (LH) de tercera generación, Y 2) La evaluación de la edad ósea frente a la edad cronológica apoya el diagnóstico de CPP, Y 3) El inicio de las características sexuales secundarias se produjo antes de los 8 años de edad para las pacientes femeninas O antes de los 9 años de edad para los pacientes masculinos.
Restricciones de edad	CPP: El paciente debe tener menos de 12 años si es mujer y menos de 13 años si es hombre
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LIBTAYO
Nombres del medicamento	LIBTAYO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico recidivante
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el carcinoma escamoso cutáneo: el paciente no es candidato a cirugía curativa ni a radiación curativa. Para el carcinoma basocelular: el paciente fue tratado previamente con un inhibidor de la vía hedgehog O el tratamiento con un inhibidor de la vía hedgehog no es apropiado. Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC): 1) la enfermedad es avanzada, recurrente o metastásica Y 2) el tumor no presenta una aberración del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) o del protooncogen tirosina-proteína quinasa ROS (ROS1).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LIDOCAÍNA PARCHES
Nombres del medicamento	LIDOCAINE, LIDOCAN III, LIDODERM, ZTLIDO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Dolor asociado a neuropatía diabética, dolor asociado a neuropatía por cáncer (incluida la neuropatía relacionada con el tratamiento [por ejemplo, neuropatía asociada a radioterapia o quimioterapia]).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LIQREV
Nombres del medicamento	LIQREV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LIVMARLI
Nombres del medicamento	LIVMARLI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento del prurito colestásico en un paciente con síndrome de Alagille (ALGS) (continuación): el paciente se ha beneficiado del tratamiento (por ejemplo, mejoría del prurito).
Restricciones de edad	-El paciente tiene 3 meses de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un hepatólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LIVTENCITY
Nombres del medicamento	LIVTENCITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en enfermedades infecciosas, especialista en trasplantes, hematólogo u oncólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	3 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LODOCO
Nombres del medicamento	LODOCO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LONSURF
Nombres del medicamento	LONSURF
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): La enfermedad es avanzada o metastásica. Para el adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, deben cumplirse todos los criterios siguientes: 1) La enfermedad es irresecable localmente avanzada, recurrente o metastásica, y 2) El paciente ha sido tratado previamente con al menos dos líneas previas de quimioterapia.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LOQTORZI
Nombres del medicamento	LOQTORZI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LORBRENA
Nombres del medicamento	LORBRENA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recidivante con linfoma quinasa anaplásico (ALK) positivo. NSCLC recurrente, avanzado o metastásico positivo para reordenamiento del represor del silenciamiento (ROS)-1 tras evolución con crizotinib, entrectinib o ceritinib. Enfermedad de Erdheim-Chester sintomática o en recaída/refractaria ALK-positiva. Tumor miofibroblástico inflamatorio (IMT) con translocación ALK.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC recurrente, avanzado o metastásico: El paciente tiene enfermedad ALK-positiva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LUCEMYRA
Nombres del medicamento	LUCEMYRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LUCENTIS
Nombres del medicamento	LUCENTIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	LUMAKRAS
Nombres del medicamento	LUMAKRAS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente KRAS G12C-positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LUMIZYME
Nombres del medicamento	LUMIZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para enfermedad de Pompe: El diagnóstico se confirmó mediante un análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática alfa glucosidasa ácida (GAA) o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LUMRYZ
Nombres del medicamento	LUMRYZ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en laboratorio del sueño, Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento o intolerancia a por lo menos un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo), O tiene una contraindicación que prohibiría probar un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo). Para el tratamiento de la cataplejía en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño. Para continuación del tratamiento: El paciente ha experimentado una disminución de la somnolencia diurna con narcolepsia o una disminución de los episodios de cataplejía con narcolepsia.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en trastornos del sueño o neurólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LUNSUMIO
Nombres del medicamento	LUNSUMIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LUPKYNIS
Nombres del medicamento	LUPKYNIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Uso en combinación con ciclofosfamida
Información médica requerida	Para nefritis lúpica: 1) el paciente está recibiendo actualmente un tratamiento terapéutico inmunosupresor (por ejemplo, micofenolato mofetilo, corticosteroides) para la nefritis lúpica, O 2) el paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación para un tratamiento terapéutico inmunosupresivo de fondo para la nefritis lúpica. En caso de continuación de la nefritis lúpica: el paciente se está beneficiando del tratamiento y el beneficio de continuar el tratamiento supera el riesgo de empeoramiento de la nefrotoxicidad.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LUPRON PED
Nombres del medicamento	LUPRON DEPOT-PED (1-MES), LUPRON DEPOT-PED (3 MESES), LUPRON DEPOT-PED (6-MESES)
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica necesaria	En caso de pubertad precoz central (CPP): Los pacientes que no estén recibiendo tratamiento en la actualidad deben cumplir todos los criterios siguientes: 1) El diagnóstico de CPP se confirmó mediante una respuesta puberal a una prueba con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) O un nivel puberal de un ensayo de hormona luteinizante (LH) de tercera generación, Y 2) La evaluación de la edad ósea frente a la edad cronológica apoya el diagnóstico de CPP, Y 3) El inicio de las características sexuales secundarias se produjo antes de los 8 años de edad para las pacientes femeninas O antes de los 9 años de edad para los pacientes masculinos.
Restricciones de edad	CPP: El paciente debe tener menos de 12 años si es mujer y menos de 13 años si es hombre
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LUPRON-ENDOMETRIOSIS
Nombres del medicamento	LUPRON DEPOT (1-MONTH), LUPRON DEPOT (3-MONTH)
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Uso fuera del indicado	Cáncer de mama, cáncer epitelial de ovario/cáncer de trompa de Falopio/cáncer peritoneal primario, tumor recurrente de glándula salival con receptor androgénico positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el retratamiento de la endometriosis, el medicamento solicitado se utiliza en combinación con acetato de noretindrona. Para miomas uterinos, el paciente debe presentar una de las siguientes condiciones: 1) Diagnóstico de anemia (por ejemplo, hematocritos inferiores o iguales al 30% y/o hemoglobina inferior o igual a 10 g/dL), O 2) el medicamento solicitado se utilizará antes de la intervención quirúrgica por miomas uterinos. En el caso del cáncer de mama, el medicamento solicitado se utiliza para la enfermedad con receptores hormonales (HR) positivos.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Miomas: 3 meses, máximo 6 meses en total. Endometriosis 6 meses, máximo 12 meses en total. Otros: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LUPRON-PRÓSTATA CA
Nombres del medicamento	LEUPROLIDE ACETATE, LUPRON DEPOT (1-MONTH), LUPRON DEPOT (3-MONTH), LUPRON DEPOT (4-MONTH), LUPRON DEPOT (6-MONTH)
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumores malignos del estroma del cordón sexual
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LYNPARZA
Nombres del medicamento	LYNPARZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recurrente con HER2 negativo, con mutación de la línea germinal BRCA 1/2, cáncer de mama recurrente o metastásico con HER2 positivo, con mutación de la línea germinal BRCA 1/2, leiomiosarcoma uterino.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer de mama recurrente o metastásico: la enfermedad tiene mutación en la línea germinal BRCA 1/2. Para el cáncer de próstata: 1) El paciente tiene una mutación BRCA y el medicamento solicitado se utilizará en combinación con abiraterona y ya sea con prednisona o con prednisolona, O 2) El paciente ha progresado con un tratamiento previo dirigido al receptor de andrógenos. Para el cáncer epitelial de ovario, de trompa de Falopio o de peritoneo primario: El medicamento solicitado se utiliza para el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad en estadio II-IV o recurrente que presenta una respuesta completa o parcial a la quimioterapia. Para leiomiosarcoma uterino: 1) el paciente ha recibido al menos un tratamiento previo, Y 2) el paciente tiene la enfermedad alterada por BRCA.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LYRICA CR
Nombres del medicamento	LYRICA CR, PREGABALIN ER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al gabapentin.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LYTGOBI
Nombres del medicamento	LYTGOBI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Colangiocarcinoma extrahepático
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el colangiocarcinoma:1) el paciente tiene un diagnóstico de colangiocarcinoma irreseccable, localmente avanzado o metastásico, 2) el paciente ha recibido un tratamiento previo, Y 3) el paciente tiene una enfermedad que presenta una fusión del gen del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGFR2) u otra reordenación.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	LYVISPAH
Nombres del medicamento	LYVISPAH
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente es incapaz de tomar formas sólidas de dosificación oral (por ejemplo, dificultad para tragar comprimidos o cápsulas, necesita su administración mediante una sonda de alimentación).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MARGENZA
Nombres del medicamento	MARGENZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MAVENCLAD
Nombres del medicamento	MAVENCLAD
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	60 días
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MAVYRET
Nombres del medicamento	MAVYRET
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Cirrosis descompensada/deterioro hepático moderado o grave (Child Turcotte Pugh [CTP] clase B o C).
Información médica requerida	Para virus de la hepatitis C (HCV): Infección confirmada por la presencia de HCV RNA en suero antes de iniciar el tratamiento. Régimen de tratamiento previsto, genotipo, antecedentes de tratamiento previo, presencia o ausencia de cirrosis (compensada o descompensada [Child Turcotte Pugh clase B o C]), presencia o ausencia de coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), presencia o ausencia de sustituciones asociadas a resistencia cuando proceda, estado del trasplante si procede. Las condiciones de cobertura y la duración específica de la autorización se basarán en las directrices de tratamiento vigentes de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (AASLD-IDSA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Los criterios se aplican de acuerdo con las directrices actuales de AASLD-IDSA
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MAYZENT
Nombres del medicamento	MAYZENT, MAYZENT STARTER PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MEGESTROL
Nombres del medicamento	MEGESTROL ACETATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Caquexia por cáncer en adultos
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a megestrol 40 miligramos a mililitros (mg/mL) suspensión oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MEKINIST
Nombres del medicamento	MEKINIST
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Erdheim-Chester, enfermedad de Rosai-Dorfman.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para melanoma: 1) El tumor es positivo para la mutación activadora BRAF V600 (por ejemplo, V600E o V600K), Y 2) El medicamento solicitado se utilizará como agente único o en combinación con dabrafenib, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará para cualquiera de los siguientes casos: a) enfermedad irreseccable, reseccable limitada o metastásica, b) tratamiento sistémico complementario. Para el cáncer del sistema nervioso central (CNS) (es decir, glioma, oligodendroglioma, astrocitoma, glioblastoma), carcinoma pulmonar no microcítico, tumores sólidos y cáncer anaplásico de tiroides: 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con dabrafenib. Para el melanoma uveal: El medicamento solicitado se utilizará como agente único. Para cáncer de ovario, cáncer de trompas de Falopio y cáncer peritoneal primario: El medicamento solicitado se utilizará para tratar enfermedades persistentes o recurrentes. Para el cáncer de vesícula biliar, el colangiocarcinoma intrahepático y colangiocarcinoma extrahepático: 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) La enfermedad es irreseccable o metastásica, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con dabrafenib. En caso de carcinoma tiroideo papilar, folicular y de células de Hurthle: 1) La enfermedad es positiva para la mutación BRAF V600E, Y 2) La enfermedad no es susceptible de tratamiento con yodo radiactivo (RAI), Y 3) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con dabrafenib.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MEKTOVI
Nombres del medicamento	MEKTOVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento sistémico complementario para melanoma cutáneo, histiocitosis de células de Langerhans
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para melanoma: 1) El tumor es positivo para la mutación activadora BRAF V600 (por ejemplo, V600E o V600K), Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con vemurafenib, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará para cualquiera de los siguientes casos: a) enfermedad irresecable, resecable limitada o metastásica, b) tratamiento sistémico complementario.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MEMANTINE
Nombres del medicamento	MEMANTINA HCL TITULACIÓN P, HIDROCLORURO DE MEMANTINA, HIDROCLORURO DE MEMANTINA E, NAMENDA TITULACIÓN PAK, NAMENDA XR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta autorización previa sólo se aplica a pacientes menores a 30 años de edad.
Grupo de autorización previa	METHYLPHENIDATE
Nombres del medicamento	CONCERTA, COTEMPLA XR-ODT, DAYTRANA, JORNAY PM, METHYLIN, METHYLPHENIDATE, METHYLPHENIDATE HYDROCHLO, QUILLICHEW ER, QUILLIVANT XR, RELEXXII, RITALIN, RITALIN LA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	1) El paciente tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) o trastorno por déficit de atención (ADD), O 2) El paciente tiene un diagnóstico de narcolepsia confirmado por un estudio del sueño, O 3) El medicamento solicitado está siendo recetado para el tratamiento de la fatiga por cáncer después de haberse descartado otras causas de fatiga.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	METHYLTESTOSTERONE
Nombres del medicamento	METHYLTESTOSTERONE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a productos alternativos de testosterona (por ejemplo, testosterona tópica, testosterona transdérmica, testosterona inyectable). En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")].
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MICO-ZN-PETR OINT
Nombres del medicamento	MICONAZOLE NITRATE/ZINC O, VUSION
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	La presencia de infección candidiásica ha sido confirmada mediante evaluación microscópica (evidencia microscópica de pseudohifas y/o levaduras en gemación) antes de iniciar el tratamiento.
Restricciones de edad	Paciente pediátrico de 4 semanas de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MIGLUSTAT
Nombres del medicamento	MIGLUSTAT, YARGESA, ZAVESCA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de enfermedad de Gaucher tipo 1 (GD1): El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática beta-glucocerebrosidasa o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MINOCYCLINE
Nombres del medicamento	MINOLIRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para lesiones inflamatorias de acné vulgar no nodular de moderado a severo: 1) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento con minociclina de liberación inmediata, O 2) El paciente ha experimentado una intolerancia a minociclina de liberación inmediata.
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MODAFINIL
Nombres del medicamento	MODAFINIL, PROVIGIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de somnolencia excesiva asociada a la narcolepsia: El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño. En caso de somnolencia excesiva asociada a la apnea obstructiva del sueño (AOS): El diagnóstico se ha confirmado mediante polisomnografía.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MONJUVI
Nombres del medicamento	MONJUVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma de células B relacionado con HIV, linfoma folicular refractario/recidivante/progresivo, trastorno linfoproliferativo monomórfico postrasplante (tipo de células B), linfoma de células B de alto grado
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) no especificado, linfoma de células B relacionado con HIV, trastorno linfoproliferativo monomórfico postrasplante (tipo de células B), linfoma de células B de alto grado, linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) no especificado, incluido el DLBCL derivado de linfoma de bajo grado: 1) el paciente tiene una enfermedad recidivante o refractaria, Y 2) el paciente no es elegible para un trasplante autólogo de células madre (ASCT).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MOTPOLY XR
Nombres del medicamento	MOTPOLY XR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una de las siguientes contraindicaciones: Aptiom (a partir de 4 años), Xcopri (a partir de 18 años), Spritam (a partir de 4 años).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MOUNJARO
Nombres del medicamento	MOUNJARO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulínico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).

Grupo de autorización previa	MOZOBIL
Nombres del medicamento	MOZOBIL, PLERIXAFOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MULPLETA
Nombres del medicamento	MULPLETA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trombocitopenia en pacientes con enfermedad hepática crónica: El recuento de plaquetas no transfundidas antes de un procedimiento programado es inferior a 50,000/mcL.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MYALEPT
Nombres del medicamento	MYALEPT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Lipodistrofia relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Obesidad generalizada no asociada a lipodistrofia generalizada.
Información médica requerida	Para lipodistrofia, el paciente cumple todos los criterios siguientes: 1) El paciente tiene un diagnóstico de lipodistrofia generalizada congénita (es decir, síndrome de Berardinelli-Seip), O lipodistrofia generalizada adquirida (es decir, síndrome de Lawrence), 2) El paciente tiene deficiencia de leptina confirmada por pruebas de laboratorio, Y 3) El paciente tiene al menos una complicación de la lipodistrofia (por ejemplo, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, aumento de los niveles de insulina en ayunas). En caso de renovación de la lipodistrofia, el paciente ha experimentado una mejora con respecto al valor inicial en el control metabólico (por ejemplo, mejora del control glucémico, disminución de los triglicéridos, disminución de los niveles de enzimas hepáticas).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MYCAPSSA
Nombres del medicamento	MYCAPSSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acromegalia, inicial: 1) El paciente tiene un alto nivel de factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) previo al tratamiento para su edad y/o sexo según el intervalo de referencia del laboratorio, Y 2) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o parcial a la cirugía o la radioterapia O existe un motivo clínico por el que el paciente no se ha sometido a cirugía o radioterapia. Para acromegalia, continuación del tratamiento: El nivel de IGF-1 del paciente ha disminuido o se ha normalizado desde el inicio del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	MYFEMBREE
Nombres del medicamento	MYFEMBREE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el sangrado menstrual abundante asociado con leiomiomas uterinos (fibromas) y dolor moderado a severo asociado con endometriosis en una paciente premenopáusica: la paciente no ha recibido ya más de o igual a 24 meses de tratamiento con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	12 meses, máximo 24 meses totales
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MYLOTARG
Nombres del medicamento	MYLOTARG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia promielocítica aguda (APL)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	MYOBLOC
Nombres del medicamento	MYOBLOC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Hiperhidrosis axilar primaria, hiperhidrosis palmar.
Criterios de exclusión	Uso cosmético.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NAGLAZYME
Nombres del medicamento	NAGLAZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El diagnóstico de mucopolisacaridosis VI (síndrome de Maroteaux-Lamy) se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa (arilsulfatasa B) o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NATPARA
Nombres del medicamento	NATPARA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Hipoparatiroidismo agudo posquirúrgico (en los 6 meses siguientes a la cirugía) y se prevé su recuperación del hipotiroidismo.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NERLYNX
Nombres del medicamento	NERLYNX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, metástasis cerebrales derivadas del cáncer de mama con HER2 positivo.
Criterios de exclusión	-
	I
	n
	f
	o
	r
	m
	a
	c
	i
	ó
	n
	m
	é
	d

*i
c
a
r
e
q
u
e
r
i
d
a
-
R
e
s
t
r
i
c
c
i
o
n
e
s
d
e
e
d
a
d*

Restricciones del recetador

Duración de la cobertura

Otros criterios

-
-
Año del plan
-

Grupo de autorización previa	NEXAVAR
Nombres del medicamento	NEXAVAR, SORAFENIB TOSYLATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia mieloide aguda, sarcoma de partes blandas (angiosarcoma, tumores desmoides/fibromatosis agresiva y subtipos de tumor fibroso solitario), tumor del estroma gastrointestinal, carcinoma medular de tiroides, osteosarcoma, cordoma recurrente, cáncer epitelial de ovario, cáncer de trompa de Falopio, cáncer peritoneal primario, neoplasias linfoides, mieloides o de linaje mixto con eosinofilia
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de leucemia mieloide aguda: la enfermedad es positiva para la mutación que involucra una duplicación en tándem interna de la tirosina cinasa 3 similar a la FMS (FLT3-ITD), Y se cumple uno de los siguientes criterios (1 O 2): 1) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de mantenimiento tras un trasplante de células madre hematopoyéticas, O 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con azacitidina o decitabina para un tratamiento de inducción o postinducción de baja intensidad, Y a) el paciente tiene 60 años o más o b) la enfermedad es recidivante/refractaria. Para el carcinoma de tiroides: la histología es folicular, papilar, de células de Hurthle o medular. Para tumor del estroma gastrointestinal (GIST), el paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) la enfermedad es irresecable, recurrente/progresiva o metastásica, Y el paciente no ha respondido a un tratamiento aprobado por la FDA (por ejemplo, imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib) O 2) el medicamento solicitado está siendo usado para paliar los síntomas si ha sido previamente tolerado y fue eficaz. Para carcinoma de células renales: la enfermedad está avanzada. Para neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia: 1) la enfermedad tiene un reordenamiento FLT3, Y 2) la enfermedad está en fase crónica o blástica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NEXLETOL
Nombres del medicamento	NEXLETOL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NEXLIZET
Nombres del medicamento	NEXLIZET
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NEXTSTELLIS
Nombres del medicamento	NEXTSTELLIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	La paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a una prueba previa de un anticonceptivo oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NEXVIAZYME
Nombres del medicamento	NEXVIAZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para enfermedad de Pompe de inicio tardío: el diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática alfa glucosidasa ácida (GAA) o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 año de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NGENLA
Nombres del medicamento	NGENLA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Pacientes pediátricos con epífisis cerrada
Información médica requerida	Para deficiencia de hormona de crecimiento (GHD) pediátrica, inicial: A) El paciente (pt) tiene una velocidad de altura (ht) de 1 año antes del tratamiento (pretratamiento) más de 2 desviaciones estándar (SD) por debajo de la media O una ht pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media y una velocidad de ht de 1 año más de 1 SD por debajo de la media Y el pt cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) falló con 2 pruebas de estimulación de la hormona del crecimiento (GH) pretratamiento (pico inferior a 10 ng/mL), 2) trastorno hipofisario/del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, defectos genéticos, anomalías estructurales adquiridas, anomalías estructurales congénitas) y factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media, O B) el paciente recibió un diagnóstico de GHD como neonato. Para GHD pediátrico GHD, continuación del tratamiento: El paciente experimenta mejoría.
Restricciones de edad	El paciente tiene 3 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NINLARO
Nombres del medicamento	NINLARO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras recidivante/refractaria, macroglobulinemia de Waldeström, linfoma linfoplasmocítico
Criterios de exclusión	-

**l
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
m
é
d
i
c
a
r
e**

**q
u
e
r
i
d
a
-
R
e
s
t
r
i
c
c
i
o
n
e
s
d
e
e
d
a
d**

Restricciones del recetador

Duración de la cobertura

Otros criterios

Año del plan

Grupo de autorización previa

Nombres del medicamento

Indicador de indicación PA

Usos fuera de lo indicado

Criterios de exclusión

Información médica requerida

NITISINONE

NITISINONE, ORFADIN

Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.

-

-

En caso de tirosinemia hereditaria tipo 1 (HT-1): El diagnóstico de HT-1 se confirmó mediante uno de los siguientes métodos: 1) pruebas bioquímicas (por ejemplo, detección de succinilacetona en orina) O 2) pruebas de ADN (análisis de mutaciones).

Restricciones de edad

Restricciones del recetador

Duración de la cobertura

Otros criterios

-

-

Año del plan

-

Grupo de autorización previa	NITYR
Nombres del medicamento	NITYR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de tirosinemia hereditaria tipo 1 (HT-1): El diagnóstico de HT-1 se confirmó mediante uno de los siguientes métodos: 1) pruebas bioquímicas (por ejemplo, detección de succinilacetona en orina) O 2) pruebas de ADN (análisis de mutaciones).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NORTHERA
Nombres del medicamento	DROXIDOPA, NORTHERA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipotensión ortostática neurogénica (nOH): Antes del tratamiento inicial, el paciente presenta una disminución persistente y constante de la presión arterial sistólica de al menos 20 mmHg, O una disminución de la presión arterial diastólica de al menos 10 mmHg en los 3 minutos siguientes a la prueba de bipedestación o de una prueba de inclinación con mesa basculante. Para continuar el tratamiento, el paciente debe experimentar una reducción sostenida de los síntomas de nOH (es decir, disminución de los mareos, aturdimiento o sensación de desmayo). Tanto para el tratamiento inicial como para la continuación del tratamiento para nOH, el medicamento solicitado se utilizará para pacientes con hipotensión ortostática neurogénica asociada a uno de los siguientes diagnósticos: 1) insuficiencia autonómica primaria debida a la enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica o insuficiencia autonómica pura, O 2) deficiencia de dopamina beta-hidroxilasa, O 3) neuropatía autonómica no diabética.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	3 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NOXAFIL POLVO
Nombres del medicamento	NOXAFIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará por vía oral. Para la profilaxis de infecciones invasivas por Aspergillus y Candida: el paciente pesa 40 kilogramos o menos.
Restricciones de edad	Entre 2 y 18 años de edad
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NOXAFIL SUSP
Nombres del medicamento	NOXAFIL, POSACONAZOLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará por vía oral. Para el tratamiento de candidiasis orofaríngea: el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al fluconazole.
Restricciones de edad	El paciente tiene 13 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Candidiasis orofaríngea: 1 mes. Todas las demás indicaciones: 6 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NPLATE
Nombres del medicamento	NPLATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trombocitopenia inmune crónica (ITP) (nuevos inicios): 1) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o es intolerante a un tratamiento previo como corticosteroides o inmunoglobulinas, Y 2) El recuento de plaquetas no transfundidas en cualquier momento anterior al inicio del medicamento solicitado es inferior a 30,000/mcL O de 30,000 a 50,000/mcL con hemorragia sintomática o factor(es) de riesgo de hemorragia (por ejemplo, someterse a un procedimiento médico u odontológico en el que se prevea pérdida de sangre, comorbilidades como úlcera péptica e hipertensión, tratamiento anticoagulante, profesión o estilo de vida que predisponga al paciente a sufrir traumatismos). Para ITP (continuación del tratamiento): El paciente presenta respuesta del recuento de plaquetas al medicamento solicitado con uno de los siguientes: 1) El recuento plaquetario actual es inferior o igual a 200,000/mcL O 2) El recuento plaquetario actual es superior a 200,000/mcL e inferior o igual a 400,000/mcL y la dosificación se ajustará a un recuento plaquetario suficiente para evitar hemorragias clínicamente importantes.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Para ITP: Inicial: 6 meses, reautorización: Año del plan para HSARS: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	NUBEQA
Nombres del medicamento	NUBEQA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NUEDEXTA
Nombres del medicamento	NUEDEXTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NUPLAZID
Nombres del medicamento	NUPLAZID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para las alucinaciones y delirios asociados con la psicosis de la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson debe hacerse antes de la aparición de los síntomas psicóticos.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	NURTEC
Nombres del medicamento	NURTEC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Tratamiento de migraña aguda: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un triptano agonista de los receptores 5-HT1. Tratamiento preventivo de migraña, inicio: El paciente cumple uno de los siguientes requisitos: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento de prueba de 4 semanas de cualquiera de los siguientes: Antiepilépticos (AED), bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos O 2) El paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación que prohibiría una prueba de 4 semanas de cualquiera de los siguientes: Antiepilépticos (AED), bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos. Tratamiento preventivo de migraña, continuación: El paciente recibió al menos 3 meses de tratamiento con el medicamento solicitado, y el paciente tuvo una reducción de los días de migraña al mes desde el inicio.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Tratamiento preventivo de la migraña - inicio: 3 meses, Todas las demás indicaciones: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OCALIVA
Nombres del medicamento	OCALIVA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para colangitis biliar primaria (PBC) sin cirrosis o con cirrosis compensada sin evidencia de hipertensión portal: Para el tratamiento inicial, 1) El diagnóstico de PBC (antes conocida como cirrosis biliar primaria) se confirma mediante al menos dos de los siguientes métodos: A) Evidencia bioquímica de colestasis con elevación del nivel de fosfatasa alcalina (ALP) durante al menos 6 meses de duración. B) Presencia de anticuerpos antimitocondriales (AMA) (título superior a 1:40 por inmunofluorescencia o reactividad inmunoenzimática) o anticuerpos antinucleares específicos de PBC ANA (p. ej., anti-gp210, anti-sp100):40 por inmunofluorescencia o reactividad inmunoenzimática) o anticuerpos antinucleares ANA específicos de PBC (p. ej., anti-gp210, anti-sp100), o C) Evidencia histológica de PBC en la biopsia hepática (p. ej., inflamación no supurativa y destrucción de los conductos biliares interlobulares y septales) y 2) El paciente tiene un nivel sérico de ALP elevado antes del inicio del tratamiento con el fármaco solicitado y cumple uno de los siguientes requisitos: A) Respuesta inadecuada a por lo menos 12 meses de tratamiento previo con ácido ursodesoxicólico (UDCA)/ursodiol y el paciente continuará el tratamiento concomitante con UDCA/ursodiol, o B) Intolerancia al UDCA/ursodiol. En caso de continuación del tratamiento de PBC: el paciente obtuvo o mantuvo un beneficio clínico del tratamiento con Ocaliva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses. Continuación: año del plan.
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OCREVUS
Nombres del medicamento	OCREVUS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OCTREOTIDE
Nombres del medicamento	OCTREOTIDE ACETATE, SANDOSTATIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Control tumoral de timomas y carcinomas tímicos.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acromegalia, inicial: 1) El paciente tiene un alto nivel de factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) previo al tratamiento para su edad y/o sexo según el intervalo de referencia del laboratorio, Y 2) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o parcial a la cirugía o la radioterapia O existe un motivo clínico por el que el paciente no se ha sometido a cirugía o radioterapia. Para acromegalia, continuación del tratamiento: El nivel de IGF-1 del paciente ha disminuido o se ha normalizado desde el inicio del tratamiento. Para el control tumoral de timomas y carcinomas tímicos: El medicamento solicitado se utilizará para tratar lo siguiente: 1) enfermedad localmente avanzada o metastásica, 2) postoperatorio tras la resección del tumor.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ODACTRA
Nombres del medicamento	ODACTRA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Asma grave, inestable o no controlada. Antecedentes de cualquier reacción alérgica sistémica grave o cualquier reacción local grave a la inmunoterapia sublingual con alérgenos. Antecedentes de esofagitis eosinofílica.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Entre 12 y 65 años de edad
Restricciones del recetador	Recetado por un alergista o inmunólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ODOMZO
Nombres del medicamento	ODOMZO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OFEV
Nombres del medicamento	OFEV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de fibrosis pulmonar idiopática (sólo para nuevos tratamientos): 1) un estudio mediante tomografía computarizada de alta resolución (HRCT) del tórax o una biopsia pulmonar revela el patrón de neumonía intersticial habitual (UIP), O 2) un estudio de HRCT del tórax revela un resultado distinto del patrón de UIP (por ejemplo, probable UIP, indeterminado para UIP) y el diagnóstico se apoya en una biopsia pulmonar o en una discusión multidisciplinar entre al menos un radiólogo y un neumólogo con experiencia en fibrosis pulmonar idiopática si no se ha realizado una biopsia pulmonar.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OGIVRI
Nombres del medicamento	OGIVRI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neocomplementario del cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, del cáncer de mama con HER2 positivo recidivante o avanzado irresecable, de metástasis leptomeníngicas del cáncer de mama con HER2 positivo, de metástasis cerebrales del cáncer de mama con HER2 positivo, del adenocarcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica con HER2 positivo, del carcinoma uterino seroso avanzado, recidivante o metastásico con HER2-positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumor recidivante de glándulas salivales con HER2 positivo, carcinoma hepatobiliar no resecable o metastásico con HER2-positivo (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático), adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o recidivante con sobreexpresión HER2 positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente presentó una reacción adversa intolerable a Trazimera y dicha reacción adversa NO se atribuyó al principio activo tal y como se describe en la información de la receta. Para cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF no mutados (WT) y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab, tucatinib o lapatinib y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para carcinoma hepatobiliar: 1) la enfermedad es HER2-positiva Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	OGSIVEO
Nombres del medicamento	OGSIVEO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OJJAARA
Nombres del medicamento	OJJAARA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OMEGA-3
Nombres del medicamento	LOVAZA, OMEGA-3-ACID ETHYL ESTERS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipertrigliceridemia: Antes del inicio del tratamiento con un medicamento para bajar los triglicéridos, el paciente tiene/tuvo un nivel de triglicéridos previo al tratamiento superior o igual a 500 mg/dL.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OMNIPOD
Nombres del medicamento	OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (G, OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5), OMNIPOD 5 G7 INTRO KIT (G, OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN 5), OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN, OMNIPOD DASH INTRO KIT (G, OMNIPOD DASH PODS (GEN 4), OMNIPOD GO 10 UNIDADES/DÍA, OMNIPOD GO 15 UNIDADES/DÍA, OMNIPOD GO 20 UNIDADES/DÍA, OMNIPOD GO 25 UNIDADES/DÍA, OMNIPOD GO 30 UNIDADES/DÍA, OMNIPOD GO 35 UNIDADES/DÍA, OMNIPOD GO 40 UNIDADES/DÍA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Omnipod GO, inicial: 1) El paciente padece diabetes que requiere control con insulina, Y 2) El paciente se mide los niveles de glucosa, el paciente será asesorado sobre el autocontrol de los niveles de glucosa o el paciente utiliza un monitor de glucosa continuo Y 3) el paciente ha experimentado una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un tratamiento con insulina basal de acción prolongada. Omnipod, V-GO, inicial: 1) El paciente padece diabetes que requiere control con insulina con múltiples inyecciones diarias, Y 2) El paciente se mide los niveles de glucosa 4 o más veces al día, O el paciente utiliza un dispositivo de control continuo de glucosa, Y 3) El paciente ha experimentado cualquiera de los siguientes síntomas con el régimen actual de diabetes: control glucémico inadecuado, hipoglucemia recurrente, grandes fluctuaciones de glucosa en sangre, fenómeno del amanecer con hiperglucemia grave persistente en la madrugada, oscilaciones glucémicas graves.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ONCASPAR
Nombres del medicamento	ONCASPAR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma extraganglionar de células T/natural killer (NK), linfoma hepatoesplénico de células T
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para linfoma extraganglionar de células T/natural killer (NK), leucemia linfoblástica aguda y linfoma hepatoesplénico de células T: el medicamento solicitado debe utilizarse junto con quimioterapia multiagente.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ONGENTYS
Nombres del medicamento	ONGENTYS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ONTRUZANT
Nombres del medicamento	ONTRUZANT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neocomplementario del cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, del cáncer de mama con HER2 positivo recidivante o avanzado irresecable, de metástasis leptomeníngicas del cáncer de mama con HER2 positivo, de metástasis cerebrales del cáncer de mama con HER2 positivo, del adenocarcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica con HER2 positivo, del carcinoma uterino seroso avanzado, recidivante o metastásico con HER2-positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumor recidivante de glándulas salivales con HER2 positivo, carcinoma hepatobiliar no resecable o metastásico con HER2-positivo (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático), adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o recidivante con sobreexpresión HER2 positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente presentó una reacción adversa intolerable a Trazimera y dicha reacción adversa NO se atribuyó al principio activo tal y como se describe en la información de la receta. Para cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF no mutados (WT) y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab, tucatinib o lapatinib y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para carcinoma hepatobiliar: 1) la enfermedad es HER2-positiva Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	ONUREG
Nombres del medicamento	ONUREG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OPDIVO
Nombres del medicamento	OPDIVO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OPDUALAG
Nombres del medicamento	OPDUALAG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OPFOLDA
Nombres del medicamento	OPFOLDA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para enfermedad de Pompe de inicio tardío: 1) El diagnóstico se confirmó mediante un ensayo enzimático que demostró una deficiencia de la actividad de la enzima alfa-glucosidasa ácida (GAA) o mediante pruebas genéticas Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con Pombiliti (cipaglicosidasa alfa-atga) Y 3) El paciente cumple LOS DOS criterios siguientes: A) pesa por lo menos 40 kilogramos (kg) y B) no mejora con el tratamiento de reemplazo de encimas (ERT) actual
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OPSUMIT
Nombres del medicamento	OPSUMIT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OPDUALAG
Nombres del medicamento	OPZELURA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento tópico a corto plazo y crónico no continuo de la dermatitis atópica (AD) de leve a moderada en un paciente no inmunodeprimido, tratamiento inicial: 1) El medicamento solicitado se utilizará en zonas sensibles (por ejemplo, cara, genitales o pliegues cutáneos) y el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un inhibidor tópico de la calcineurina, O 2) El medicamento solicitado se utilizará en zonas cutáneas no sensibles (o restantes) y el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un inhibidor tópico de la calcineurina o a un corticosteroide tópico de potencia media o superior. Para el tratamiento tópico crónico a corto plazo y no continuo de la dermatitis atópica de leve a moderada en un paciente no inmunodeprimido, continuación del tratamiento: El paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva. Para el tratamiento tópico del vitíligo no segmentario (NVS): El medicamento solicitado se aplicará en zonas afectadas de un 10% o menos de superficie corporal (BSA). Para el tratamiento tópico del vitíligo no segmentario, continuación del tratamiento: El paciente logró o mantuvo una repigmentación significativa.
Restricciones de edad	AD, NSV: 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	AD, Inicio: 3 meses, NSV, inicial: 7 meses, AD, NSV, continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ORAL-INTRANASAL FENTANYL
Nombres del medicamento	FENTANYL CITRATE, FENTANYL CITRATE ORAL TRA, FENTORA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	1) El medicamento solicitado está indicado únicamente para el tratamiento del dolor intercurrente relacionado con el cáncer. El medicamento solicitado se receta para el tratamiento del dolor intercurrente en un paciente con cáncer con dolor oncológico subyacente Y 2) El código de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD) proporcionado apoya el diagnóstico relacionado con el cáncer. [Nota: En caso de aprobación de la cobertura de medicamentos, el código de diagnóstico ICD proporcionado DEBE respaldar el diagnóstico relacionado con el cáncer] Y 3) El paciente está recibiendo actualmente, y seguirá recibiendo, tratamiento con opioides las 24 horas del día para el dolor subyacente del cáncer Y 4) El medicamento solicitado está destinado únicamente para su uso en pacientes tolerantes a los opioides. El paciente puede tomar con seguridad la dosis solicitada basándose en sus antecedentes actuales sobre consumo de opiáceos. [Nota: Los pacientes considerados tolerantes a los opiáceos son aquellos que toman durante todo el día medicamentos que contengan al menos 60 mg de morfina oral al día, al menos 25 mcg por hora de fentanilo transdérmico, al menos 30 mg de oxicodona oral al día, al menos 60 mg de hidrocodona oral al día, al menos 8 mg de hidromorfona oral al día, al menos 25 mg de oximorfona oral al día, o una dosis equianalgésica de otro medicamento opiáceo al día durante una semana o más].
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ORALAIR
Nombres del medicamento	ORALAIR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Asma grave, inestable o no controlada. Antecedentes de cualquier reacción alérgica sistémica grave o cualquier reacción local grave a la inmunoterapia sublingual con alérgenos. Antecedentes de esofagitis eosinofílica.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Entre 5 y 65 años de edad
Restricciones del recetador	Recetado por un alergista o inmunólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ORENITRAM
Nombres del medicamento	ORENITRAM, ORENITRAM TITRATION KIT M
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevos tratamientos: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ORGOVYX
Nombres del medicamento	ORGOVYX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ORIAHNN
Nombres del medicamento	ORIAHNN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el sangrado menstrual abundante asociado con leiomiomas uterinos (fibromas) en una paciente premenopáusica: la paciente no ha recibido ya más de o igual a 24 meses de tratamiento con un medicamento que contenga elagoliz.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	12 meses, máximo 24 meses totales
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ORLISSA
Nombres del medicamento	ORLISSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el dolor moderado a fuerte asociado con endometriosis: la paciente no ha recibido ya más de o igual a 24 meses de tratamiento con un medicamento que contenga elagoliz.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	12 meses, máximo 24 meses totales
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ORKAMBI
Nombres del medicamento	ORKAMBI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para fibrosis quística (CF): El medicamento solicitado no se utilizará en combinación con otros medicamentos que contengan ivacaftor.
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 año de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ORLADEYO
Nombres del medicamento	ORLADEYO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de prevención de crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes requisitos: 1) el paciente padece angioedema hereditario (HAE) con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece angioedema hereditario con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ORSERDU
Nombres del medicamento	ORSERDU
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor hormonal positivo, con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Cáncer de mama: 1) la enfermedad es receptora de estrógeno (ER) positiva, receptora del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativa y ESR1 mutada Y 2) la paciente cumple uno de los siguientes requisitos: a) la enfermedad es avanzada, recidivante o metastásica, Y la paciente presenta evolución de la enfermedad tras al menos una línea de tratamiento endocrino, O b) la enfermedad no respondió al tratamiento sistémico preoperatorio.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OSMOLEX ER
Nombres del medicamento	OSMOLEX ER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la amantadine de liberación inmediata.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OTEZLA
Nombres del medicamento	OTEZLA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de psoriasis en placas (sólo para nuevos tratamientos): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) Respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a CUALQUIERA de los siguientes: a) tratamiento tópico (por ejemplo, corticosteroides tópicos, inhibidores de la calcineurina, análogos de la vitamina D), b) fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA), o c) tratamiento farmacológico con metotrexato, ciclosporina o acitretina, O 2) el tratamiento farmacológico con metotrexato, ciclosporina o acitretina está contraindicado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OXAZEPAM
Nombres del medicamento	OXAZEPAM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todas las indicaciones: Para todas las indicaciones: el médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con el medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. (Nota: La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlo a dosis reducidas o utilizarlo con precaución o cuidadosamente controlado). Para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, la ansiedad asociada a la depresión y el tratamiento de la ansiedad, la tensión, la agitación y la irritabilidad en pacientes de edad avanzada: 1) El medicamento solicitado se está utilizando simultáneamente con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (SSRI) o un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI) hasta que el SSRI/SNRI sea eficaz para los síntomas de ansiedad, O 2) el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para AL MENOS DOS agentes de las siguientes clases: a) inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), o b) inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (SNRI):
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Alivio de ansiedad a corto plazo-1 mes, Trastornos de ansiedad-4 meses, Abstinencia alcohólica - Año del plan.
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores.
Grupo de autorización previa	OXBRYTA
Nombres del medicamento	OXBRYTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 4 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OXERVATE
Nombres del medicamento	OXERVATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	8 semanas
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OXICONAZOLE
Nombres del medicamento	OXISTAT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes: 1) clotrimazol en crema, Y 2) ketoconazol en crema o champú.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	3 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	OXLUMO
Nombres del medicamento	OXLUMO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hiperoxaluria primaria tipo 1 (PH1): el diagnóstico se ha confirmado mediante una prueba genética molecular que muestra una mutación en el gen de la alanina:glioxilato aminotransferasa (AGXT) o un análisis de enzimas hepáticas que demuestra una actividad ausente o significativamente reducida de la alanina:glioxilato aminotransferasa (AGT). En caso de continuación del tratamiento: el paciente ha experimentado una disminución o normalización de los niveles de cualquiera de los siguientes factores desde el inicio del tratamiento: 1) oxalato urinario, 2) oxalato plasmático.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	OZEMPIC
Nombres del medicamento	OZEMPIC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulínico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).

Grupo de autorización previa	PADCEV
Nombres del medicamento	PADCEV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma urotelial, el medicamento solicitado será usado para el tratamiento de cualquiera de los siguientes: a) carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico, b) carcinoma urotelial de vejiga con recidiva local músculo-invasiva o enfermedad persistente en una vejiga preservada, c) carcinoma urotelial de vejiga con recidiva metastásica o local postcistectomía, d) carcinoma primario recurrente de uretra, o e) carcinoma urotelial de vejiga en estadio II-IV.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PALFORZIA
Nombres del medicamento	PALFORZIA DOSIS INICIAL ES, PALFORZIA NIVEL 1, PALFORZIA NIVEL 10, PALFORZIA NIVEL 11 (MAINT, PALFORZIA NIVEL 11 (TITRA, PALFORZIA NIVEL 2, PALFORZIA NIVEL 3, PALFORZIA NIVEL 4, PALFORZIA NIVEL 5, PALFORZIA NIVEL 6, PALFORZIA NIVEL 7, PALFORZIA NIVEL 8, PALFORZIA NIVEL 9
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Asma no controlada. Antecedentes de esofagitis eosinofílica. Otras enfermedades gastrointestinales eosinofílicas.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Dosificación ascendente y fase de mantenimiento del tratamiento: 4 años de edad o más. De otra forma: de 4 a 17 años.
Restricciones del recetador	Recetado por un alergista o inmunólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PALYNZIQ
Nombres del medicamento	PALYNZIQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PALYNZIQ
Nombres del medicamento	PANRETIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento tópico de lesiones cutáneas en pacientes con sarcoma de Kaposi no relacionado con el SIDA
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PAROXETINE SUSP
Nombres del medicamento	PAROXETINE HYDROCHLORIDE, PAXIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente es incapaz de tomar formas de dosificación oral sólidas (por ejemplo, dificultad para tragar comprimidos o cápsulas).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PEGASYS
Nombres del medicamento	PEGASYS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Uso fuera del indicado en la etiqueta	Neoplasia mieloproliferativa (trombocitemia esencial, policitemia vera, mielofibrosis sintomática de bajo riesgo), mastocitosis sistémica, leucemia/linfoma de células T del adulto, micosis fungoide/síndrome sezario, trastornos linfoproliferativos cutáneos primarios de células T CD30+, leucemia de células pilosas, enfermedad de Erdheim-Chester, tratamiento inicial durante el embarazo de la leucemia mieloide crónica.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hepatitis C crónica: Virus de la hepatitis C (HCV) confirmado por la presencia en el RNA del HCV del virus de la hepatitis C en suero antes de iniciar el tratamiento y el régimen de tratamiento previsto.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	HCV: 12-48 semanas. Los criterios se aplican de acuerdo con las directrices actuales de AASLD/ IDSA. HBV: 48 semanas Otros: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PEMAZYRE
Nombres del medicamento	PEMAZYRE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PERJETA
Nombres del medicamento	PERJETA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumores recidivantes de glándulas salivales positivos para HER2, metástasis cerebrales procedentes del cáncer de mama con HER2-positivo, cánceres hepatobiliares con HER2 positivo irresecables o metastásicos (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF natural (WT), Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con trastuzumab, Y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para tumores recurrentes de glándulas salivales con HER2 positivo, metástasis cerebrales de cáncer de mama con HER2 positivo y cáncer hepatobiliar con HER2 positivo irresecable o metastásico (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático): el medicamento solicitado se utiliza en combinación con trastuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PHENYL BUTYRATE
Nombres del medicamento	BUPHENYL, OLPRUVA, PHEBURANE, SODIUM PHENYL BUTYRATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trastornos del ciclo de la úrea (UCD): El diagnóstico de UCD se confirmó mediante pruebas enzimáticas, bioquímicas o genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PHESGO
Nombres del medicamento	PHESGO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PIMECROLIMUS
Nombres del medicamento	ELIDEL, PIMECROLIMUS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Psoriasis en la cara, los genitales o los pliegues cutáneos.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para dermatitis atópica de leve a moderada, el paciente cumple alguno de los criterios siguientes: 1) la enfermedad afecta a zonas sensibles de la piel (por ejemplo, cara, genitales o pliegues cutáneos), O 2) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un agente terapéutico de primera línea (por ejemplo, corticosteroide tópico de potencia media o superior).
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PIQRAY
Nombres del medicamento	PIQRAY 200MG DOSIS DIARIA, PIQRAY 250MG DOSIS DIARIA, PIQRAY 300MG DOSIS DIARIA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor hormonal (HR) positivo, con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, cáncer de mama con PIK3CA mutado en combinación con fulvestrant.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PLEGRIDY
Nombres del medicamento	PLEGRIDY, PLEGRIDY STARTER PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	POLIVY
Nombres del medicamento	POLIVY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Transformación histológica de linfomas poco activos en linfoma difuso de células B grandes, trastornos linfoproliferativos postrasplante monomórficos (tipo de células B), linfomas de células B relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (linfoma difuso de células B grandes relacionado con el SIDA, linfoma de efusión primaria, linfoma difuso de células B grandes positivo para virus del herpes humano 8 (HHV8), no especificado de otro modo, y linfoma plasmablasto relacionado con el SIDA), y linfoma folicular.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	POMALYST
Nombres del medicamento	POMALYST
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras recidivante/refractaria, linfoma primario del sistema nervioso central (CNS), síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal, cambios cutáneos).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el mieloma múltiple, el paciente ha recibido previamente al menos dos tratamientos previos para el mieloma múltiple, incluyendo un agente inmunomodulador Y un inhibidor del proteasoma.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	POMBILITI
Nombres del medicamento	POMBILITI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para enfermedad de Pompe de inicio tardío: 1) El diagnóstico se confirmó mediante un ensayo enzimático que demostró una deficiencia de la actividad de la enzima alfa-glucosidasa ácida (GAA) o mediante pruebas genéticas Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con Opfolda (miglustat) Y 3) El paciente cumple LOS DOS criterios siguientes: A) pesa por lo menos 40 kilogramos (kg) y B) no mejora con el tratamiento de reemplazo de encimas (ERT) actual
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PONVORY
Nombres del medicamento	PONVORY, PONVORY 14-DAY STARTER PA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PORTRAZZA
Nombres del medicamento	PORTRAZZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	POSACONAZOLE
Nombres del medicamento	NOXAFIL, POSACONAZOLE DR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará por vía oral. Para la profilaxis de infecciones invasivas por Aspergillus y Candida: el paciente pesa más de 40 kilogramos.
Restricciones de edad	Tratamiento de aspergilosis invasiva: 13 años o más, profilaxis de las infecciones invasivas por Aspergillus y Candida: 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	POTELIGEO
Nombres del medicamento	POTELIGEO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma/leucemia de células T en adultos
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PREGABALIN
Nombres del medicamento	LYRICA, PREGABALIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Uso fuera del indicado en la etiqueta	Dolor neuropático por cáncer, dolor neuropático relacionado con el tratamiento del cáncer
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la neuralgia postherpética, el tratamiento del dolor neuropático por neuropatía diabética periférica, dolor neuropático por cáncer y dolor neuropático relacionado con el tratamiento del cáncer: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a gabapentin.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PREVYMIS
Nombres del medicamento	PREVYMIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la profilaxis de la infección o enfermedad por citomegalovirus (CMV) en trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT): 1) el paciente es seropositivo al CMV, Y 2) el paciente es receptor de un HSCT alogénico. En caso de profilaxis de la enfermedad por CMV en trasplante renal: 1) el paciente es seronegativo para CMV, Y 2) el paciente es un receptor de alto riesgo de trasplante renal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	7 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	PRILOSEC POLVO
Nombres del medicamento	PRILOSEC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento y prevención de la úlcera gastrointestinal inducida por antiinflamatorios no esteroideos, estenosis esofágica, dispepsia, tratamiento de mantenimiento de las úlceras duodenales
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente es incapaz de tomar formas sólidas de dosificación oral (por ejemplo, dificultad para tragar comprimidos o cápsulas, necesita su administración mediante una sonda de alimentación).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PROCRT
Nombres del medicamento	PROCRT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Anemia debida a síndromes mielodisplásicos (MDS), anemia en la artritis reumatoide (RA), anemia debida al tratamiento de la hepatitis C (ribavirina en combinación con interferón alfa o peginterferón alfa)
Criterios de exclusión	Pacientes que reciben quimioterapia con intención curativa. Pacientes con cáncer mieloide.
Información médica requerida	Los requisitos relativos a los valores de hemoglobina (Hgb) excluyen los valores debidos a una transfusión reciente. En caso de aprobación inicial: 1) Para todos los usos salvo anemia debida a quimioterapia o síndrome mielodisplásico (MDS): el paciente tiene reservas adecuadas de hierro (por ejemplo, una saturación de transferrina [TSAT] mayor o igual al 20%), Y 2) Para todos los usos salvo cirugía: la hemoglobina (Hgb) pretratamiento (sin tratamiento con eritropoyetina en el mes anterior) es inferior a 10 g/dL, Y 3) Para MDS: el nivel de eritropoyetina sérica pretratamiento es igual o inferior a 500 unidades internacionales/L. Para reautorizaciones (el paciente recibió tratamiento con eritropoyetina en el mes anterior) en todos los usos salvo cirugía: 1) El paciente ha recibido al menos 12 semanas de tratamiento con eritropoyetina, Y 2) El paciente ha respondido al tratamiento con eritropoyetina, Y 3) La Hgb actual es inferior a 12 g/dL, Y 4) para todos los usos salvo anemia por quimioterapia o MDS: el paciente tiene reservas de hierro adecuadas (por ejemplo, una saturación de transferrina [TSAT] superior o igual al 20%).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	16 semanas
Otros Criterios	La cobertura incluye el uso en anemia en pacientes cuyas creencias religiosas prohíben las transfusiones de sangre. Se denegará la cobertura en virtud de la Parte D si la cobertura está disponible en virtud de la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento es recetado y dispensado o administrado para el individuo (por ejemplo, utilizado para el tratamiento de anemia de un paciente con insuficiencia renal crónica que se somete a diálisis, o suministrado por un médico como parte de un servicio médico).

Grupo de autorización previa	PROCYSBI
Nombres del medicamento	PROCYSBI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cistinosis nefropática: 1) El diagnóstico fue confirmado por CUALQUIERA de los siguientes métodos: a) la presencia de una mayor concentración de cistina en leucocitos, O b) pruebas genéticas, O c) demostración de cristales de cistina en la córnea mediante examen con lámpara de hendidura, Y 2) el paciente ha experimentado intolerancia a un tratamiento previo con Cystagon (bitartrato de cisteamina de liberación inmediata).
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 año de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	PROMACTA
Nombres del medicamento	PROMACTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trombocitopenia inmune (ITP) crónica o persistente: 1) Para nuevos comienzos: a) El paciente (pt) ha tenido una respuesta inadecuada o es intolerante a un tratamiento previo como corticosteroides o inmunoglobulinas, Y b) El recuento de plaquetas (ptl) no transfundidas en cualquier momento anterior al inicio del medicamento solicitado es inferior a 30,000/mcL O de 30,000 a 50,000/mcL con hemorragia sintomática o factores de riesgo de hemorragia (por ejemplo, someterse a un procedimiento médico u odontológico en el que se prevea pérdida de sangre, comorbilidades como úlcera péptica e hipertensión, tratamiento anticoagulante, profesión o estilo de vida que predisponga al paciente a sufrir traumatismos), Y c) solo para trombocitopenia inmune (ITP) crónica: el paciente ha presentado una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a Doptelet (avatrombopag). 2) En caso de continuación del tratamiento, la respuesta del recuento plaquetario al medicamento solicitado: a) El recuento plaquetario actual e inferior o igual a 200,000/mcL O b) El recuento plaquetario actual es superior a 200,000/mcL e inferior o igual a 400,000/mcL y la dosificación se ajustará a un recuento plaquetario suficiente para evitar hemorragias clínicamente importantes. Para trombocitopenia asociada a hepatitis C crónica: 1) Para nuevos comienzos: el medicamento solicitado se utiliza para el inicio y el mantenimiento del tratamiento basado en interferón. 2) En caso de continuación del tratamiento: el paciente está recibiendo tratamiento basado en interferón. En caso de anemia aplásica (AA) grave: 1) Para nuevos inicios: a) El paciente utilizará el medicamento solicitado con un tratamiento inmunosupresor estándar para el tratamiento de primera línea, O b) el paciente tuvo una respuesta insuficiente al tratamiento inmunosupresor. 2) Para continuación del tratamiento: 1) El recuento plaquetario actual es de 50,000-200,000/mcL, O 2) El recuento plaquetario actual es inferior a 50,000/mcL y el paciente no ha recibido una terapia adecuadamente titulada durante al menos 16 semanas, O 3) El recuento plaquetario actual es inferior a 50,000/mcL y el paciente no depende de transfusiones, O 4) El recuento plaquetario actual es superior a 200,000/mcL e inferior o igual a 400,000/mcL y la dosis se ajustará para alcanzar y mantener un recuento plaquetario objetivo adecuado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	HCV: 6 meses, ITP/AA inicial: 6 meses, ITP reautorización: Año del plan, AA reautorización: APR-Año del plan, IPR-16 semanas
Otros criterios	APR: respuesta plaquetaria adecuada (superior a 50,000/mcL), IPR: respuesta plaquetaria inadecuada (inferior a 50,000/mcL).

Grupo de autorización previa	PULMOZYME
Nombres del medicamento	PULMOZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	PYRUKYND
Nombres del medicamento	PYRUKYND, PYRUKYND TAPER PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para anemia hemolítica en un paciente con deficiencia de piruvato quinasa (PK): El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática PK o mediante pruebas genéticas. En caso de anemia hemolítica en un paciente con deficiencia de PK (continuación del tratamiento): El paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva (por ejemplo, mejora de los niveles de hemoglobina, reducción de las transfusiones de sangre).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 7 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	QELBREE
Nombres del medicamento	QELBREE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente cumple todos los criterios siguientes: 1) el paciente tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) o trastorno por déficit de atención (ADD), Y 2) el paciente será vigilado estrechamente para detectar pensamientos o comportamientos suicidas, empeoramiento clínico y cambios inusuales en el comportamiento, Y 3) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a la atomoxetina O el paciente tiene dificultad para tragar cápsulas orales.
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	QINLOCK
Nombres del medicamento	QINLOCK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumor del estroma gastrointestinal recurrente/progresivo o irresecable
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para tumor del estroma gastrointestinal (GIST) irresecable, recurrente/progresivo, avanzado o metastásico, el paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el paciente ha recibido tratamiento previo con 3 o más inhibidores de la cinasa, incluido imatinib O 2) el paciente ha experimentado una evolución de la enfermedad tras el tratamiento con avapritinib y dasatinib.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	QUETIAPINE XR
Nombres del medicamento	QUETIAPINE FUMARATE ER, SEROQUEL XR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento en monoterapia de mantenimiento del trastorno bipolar I, tratamiento en monoterapia del trastorno de ansiedad generalizada, tratamiento en monoterapia del trastorno depresivo mayor
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todas las indicaciones: Si el paciente tiene 65 años o más Y está utilizando dos o más medicamentos adicionales activos del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, lorazepam, sertralina, clonazepam, escitalopram, alprazolam, zolpidem) con el medicamento solicitado, el médico recetante determinó que tomar múltiples medicamentos activos del sistema nervioso central (CNS) es médicamente necesario. [Nota: El uso de múltiples medicamentos activos del sistema nervioso central (CNS) en adultos mayores se asocia con un mayor riesgo de caídas]. Para el tratamiento de esquizofrenia: El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, lurasidona, olanzapina, quetiapina de liberación inmediata, risperidona, ziprasidona. Para el tratamiento agudo de episodios maníacos o mixtos asociados al trastorno bipolar I o al tratamiento de mantenimiento de trastorno bipolar I: El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a dos de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, olanzapina, quetiapina de liberación inmediata, risperidona, ziprasidona. Para el tratamiento agudo de episodios depresivos asociados al trastorno bipolar I: El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: lurasidona, olanzapina, quetiapina de liberación inmediata. Para el tratamiento agudo de episodios depresivos asociados al trastorno bipolar II: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la gabapentina genérica de liberación inmediata. Para el tratamiento complementario del trastorno depresivo mayor (MDD): El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: aripiprazole, olanzapina, quetiapina de liberación inmediata.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	QUININE SULFATE
Nombres del medicamento	QUALAQUIN, QUININE SULFATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Babesiosis, paludismo no complicado por Plasmodium vivax.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para babesiosis: el medicamento solicitado se utiliza en combinación con clindamicina.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes

Otros criterios

-

Grupo de autorización previa	QULIPTA
Nombres del medicamento	QULIPTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Tratamiento preventivo de la migraña, inicial: 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento en una prueba de 4 semanas de cualquiera de los siguientes: medicamentos antiepilépticos (AED), agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos O 2) El paciente experimentó una intolerancia o tiene una contraindicación que le impediría probar durante 4 semanas cualquiera de los siguientes: medicamentos antiepilépticos (AED), agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antidepresivos. Tratamiento preventivo de migraña, continuación: El paciente recibió al menos 3 meses de tratamiento con el medicamento solicitado, y experimentó una reducción de los días de migraña al mes con relación al inicio.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 3 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	QUTENZA
Nombres del medicamento	QUTENZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de neuralgia postherpética (PHN) y la neuropatía diabética periférica (DPN) de los pies: El paciente ha respondido inadecuadamente a un tratamiento de un mes de gabapentina genérica o presenta una intolerancia o tiene una contraindicación a la gabapentina.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RADICAVA
Nombres del medicamento	RADICAVA, RADICAVA ORS, RADICAVA ORS STARTER KIT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de esclerosis lateral amiotrófica (ALS): 1) El diagnóstico se clasifica como ALS definitiva o probable, Y 2) Sólo para nuevos comienzos: El paciente tiene puntuaciones de al menos 2 puntos en las 12 áreas de la escala revisada de valoración funcional de la esclerosis lateral amiotrófica (ALSFRS-R). En caso de continuación del tratamiento de la ALS: Existe un beneficio clínico del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RAGWITEK
Nombres del medicamento	RAGWITEK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Asma grave, inestable o no controlada. Antecedentes de cualquier reacción alérgica sistémica grave o cualquier reacción local grave a la inmunoterapia sublingual con alérgenos. Antecedentes de esofagitis eosinofílica.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Entre 5 y 65 años de edad
Restricciones del recetador	Recetado por un alergista o inmunólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RAVICTI
Nombres del medicamento	RAVICTI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trastornos del ciclo de la úrea (UCD): El diagnóstico de UCD se confirmó mediante pruebas enzimáticas, bioquímicas o genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	REBLOZYL
Nombres del medicamento	REBLOZYL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para anemia con beta talasemia o anemia en síndromes mielodisplásicos o neoplasia mielodisplásica/mieloproliferativa, el paciente cumple el siguiente criterio: Para los nuevos casos, el paciente tiene un diagnóstico de anemia evidenciado por un nivel de hemoglobina pretratamiento o pretransfusión inferior o igual a 11 g/dL. En caso de continuación del tratamiento, el paciente cumple todos los requisitos siguientes: 1) el paciente tiene un nivel de hemoglobina previo a la dosis inferior o igual a 11 g/dL (el nivel de hemoglobina actual o previo a la transfusión debe tenerse en cuenta a efectos de dosificación) o el médico recetante acepta retener la dosis hasta que el nivel de hemoglobina descienda a 11 g/dL o menos, 2) el paciente debe lograr o mantener la reducción de la carga de transfusión de glóbulos rojos o no ha recibido tres dosis consecutivas a la dosis máxima, y 3) el paciente no debe experimentar una toxicidad inaceptable con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	En caso de beta talasemia: 16 semanas. Para síndromes mielodisplásicos: 24 semanas.
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	REBYOTA
Nombres del medicamento	REBYOTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de prevención de la recurrencia de la infección por Clostridioides difficile (CDI): 1) El diagnóstico de CDI ha sido confirmado por un análisis de heces positivo para la toxina de C. difficile o C. difficile toxigénico, Y 2) El medicamento solicitado se administrará entre 24 y 72 horas después de la última dosis de antibióticos utilizados para el tratamiento de CDI recurrente.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RECORLEV
Nombres del medicamento	RECORLEV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	REGRANEX
Nombres del medicamento	REGRANEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	20 semanas
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RELISTOR INJ
Nombres del medicamento	RELISTOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides en un paciente con dolor crónico no oncológico, incluido el dolor crónico relacionado con un cáncer previo o su tratamiento que no requiera un aumento frecuente (por ejemplo, semanal) de la dosis de opioides: 1) el paciente es incapaz de tolerar medicamentos orales O 2) el paciente cumple uno de los siguientes criterios A) respondió inadecuadamente al tratamiento o intolerancia a un medicamento oral indicado para el estreñimiento inducido por opioides en un paciente con dolor crónico no oncológico (por ejemplo, Movantik) O B) el paciente tiene una contraindicación que prohibiría probar un medicamento oral para el estreñimiento inducido por opioides en un paciente con dolor crónico no oncológico (por ejemplo, Movantik).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	4 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RELISTOR TAB
Nombres del medicamento	RELISTOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	4 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RELYVRIO
Nombres del medicamento	RELYVRIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de esclerosis lateral amiotrófica (ALS): 1) El paciente tiene un diagnóstico de ALS definitivo o probable Y 2) Para la continuación del tratamiento: Existe un beneficio clínico del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RENFLEXIS
Nombres del medicamento	RENFLEXIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Síndrome de Behçet, hidradenitis supurativa, artritis idiopática juvenil, pioderma gangrenoso, sarcoidosis, arteritis de Takayasu, uveítis.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes criterios: a) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con metotrexato (MTX) o leflunomida O b) intolerancia o tiene una contraindicación a MTX Y leflunomida, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) respuesta inadecuada, intolerancia o tiene una contraindicación a MTX O b) respuesta inadecuada o intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. En caso de espondilitis anquilosante activa (sólo en nuevos tratamientos): respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) O contraindicación que prohíba probar con NSAID. En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente o intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% del BSA o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	En caso de hidradenitis supurativa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente tiene una enfermedad grave y refractaria. En caso de uveítis (sólo para nuevos tratamientos): Respuesta inadecuada o intolerancia o tiene una CI a una prueba de tratamiento inmunosupresor para la uveítis.
Grupo de autorización previa	REPATHA
Nombres del medicamento	REPATHA, REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM, REPATHA SURECLICK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RETEVMO
Nombres del medicamento	RETEVMO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico reordenado recurrente positivo durante la transfección (RET), histiocitosis de células de Langerhans con una fusión del gen RET, enfermedad de Erdheim-Chester sintomática o con recaída/refractaria con una fusión del gen RET, enfermedad de Rosai-Dorfman sintomática o con recaída/refractaria con fusión del gen RET, carcinoma de tiroides recurrente o persistente con fusión RET positiva (carcinoma papilar, carcinoma folicular y carcinoma de células de Hurthle), carcinoma anaplásico de tiroides con fusión RET positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el carcinoma pulmonar no microcítico, el paciente debe cumplir todos los requisitos siguientes: 1) la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica Y 2) el tumor es reordenado recurrente con fusión de RET positiva o con reordenamiento de RET positivo.
Restricciones de edad	Cáncer medular de tiroides y cáncer de tiroides: 12 años de edad o más.
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	REVCOVI
Nombres del medicamento	REVCOVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	REVLIMID
Nombres del medicamento	LENALIDOMIDE, REVLIMID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras, linfoma de Hodgkin clásico, síndrome mielodisplásico sin anomalía citogenética de delección 5q, anemia asociada a mielofibrosis, síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal, cambios cutáneos), neoplasias mieloproliferativas, sarcoma de Kaposi, histiocitosis de células de Langerhans, linfomas periféricos de células T no especificados, linfoma angioinmunoblástico de células T (AITL), linfoma de células T asociado a enteropatía, linfoma intestinal epiteliotrópico monomórfico de células T, linfoma ganglionar periférico de células T, leucemia/linfoma de células T del adulto, linfoma hepatoesplénico de células T, linfoma primario del sistema nervioso central (CNS), leucemia linfocítica crónica (CLL)/linfoma linfocítico pequeño (SLL), linfoma de células B relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), trastorno linfoproliferativo monomórfico postrasplante, linfoma difuso de células B grandes, enfermedad de Castleman multicéntrica, linfomas de células B de alto grado, transformación histológica de linfoma poco activo a linfoma difuso de células B grandes.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el síndrome mielodisplásico (MDS): el paciente tiene MDS de bajo riesgo con anemia sintomática según el Sistema Pronóstico Internacional revisado (IPSS-R), el Sistema Pronóstico Internacional revisado (IPSS) o el Sistema de Puntuación Pronóstica basado en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WPSS).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	REZLIDHIA
Nombres del medicamento	REZLIDHIA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	REZUROCK
Nombres del medicamento	REZUROCK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RINVOQ
Nombres del medicamento	RINVOQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de artritis psoriásica activa (sólo en nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del TNF (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de colitis ulcerosa de moderada a severamente activa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) (por ejemplo, adalimumab-aacf, Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de enfermedad de Crohn de moderada a severamente activa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del TNF (por ejemplo, adalimumab-aacf, Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de dermatitis atópica (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente tiene una enfermedad refractaria, de moderada a grave, Y 2) el paciente ha tenido una respuesta inadecuada al tratamiento con otros medicamentos sistémicos, incluidos los biológicos, o el uso de estos tratamientos es desaconsejable. Para dermatitis atópica, continuación del tratamiento: el paciente logró o mantuvo una respuesta clínica positiva. En caso de espondilitis anquilosante activa (sólo en nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del TNF (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de espondiloartritis axial no radiográfica (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del TNF.
Restricciones de edad	Dermatitis atópica: 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Dermatitis atópica (inicio): 4 meses, todas las demás: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ROZLYTREK
Nombres del medicamento	ROZLYTREK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recidivante ROS1 positivo, tumores sólidos no metastásicos con fusión del gen neurotrófico tirosina receptor quinasa (NTRK) positivo, tratamiento de primera línea de tumores sólidos con fusión del gen NTRK positivo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todos los tumores sólidos positivos a la fusión del gen de la tirosina cinasa neurotrófica (NTRK), la enfermedad no presenta una mutación de resistencia adquirida conocida. Para el carcinoma pulmonar no microcítico ROS1-positivo, el paciente tiene enfermedad recurrente, avanzada o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RUBRACA
Nombres del medicamento	RUBRACA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leiomioma uterino, adenocarcinoma pancreático, cáncer epitelial avanzado (estadio II-IV) de ovario, trompa de Falopio o peritoneal primario
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con una mutación deletérea del gen de susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA) (línea germinal y/o somática): 1) el paciente ha sido tratado con un tratamiento específico al receptor de andrógenos, Y 2) el paciente ha sido tratado con una quimioterapia basada en taxanos o el paciente no es apto para quimioterapia, Y 3) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral. Para el tratamiento de mantenimiento del cáncer epitelial de ovario, de trompa de Falopio y primario de peritoneo con mutación BRCA: 1) el paciente tiene enfermedad avanzada (estadio II-IV) y presenta una respuesta completa o parcial al tratamiento primario, O 2) el paciente tiene enfermedad recurrente y presenta una respuesta completa o parcial a la quimioterapia basada en platino. Para leiomioma uterino: 1) el paciente ha recibido al menos un tratamiento de segunda línea, Y 2) el paciente tiene la enfermedad alterada por BRCA. Para adenocarcinoma pancreático: 1) el paciente tiene enfermedad metastásica, Y 2) el paciente tiene mutaciones somáticas o de línea germinal BRCA o PALB-2.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RUCONEST
Nombres del medicamento	RUCONEST
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el paciente padece HAE con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece HAE con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 13 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RYBELSUS
Nombres del medicamento	RYBELSUS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulíntrópico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).

Grupo de autorización previa	RYBREVANT
Nombres del medicamento	RYBREVANT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente con mutación de inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RYDAPT
Nombres del medicamento	RYDAPT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia mieloide aguda (AML) recidivante o refractaria, neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamientos FGFR1 o FLT3, terapia postinducción para AML, reinducción en enfermedad residual para AML
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide aguda (AML): La AML es positiva para la mutación de la tirosina quinasa 3 similar al FMS (FLT3). Para neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamientos del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 1 (FGFR1) o FLT3: la enfermedad está en fase crónica o blástica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	RYLAZE
Nombres del medicamento	RYLAZE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia mieloide aguda (AML), linfoma extraganglionar de células T/natural killer (NK) de tipo nasal (ENKTL)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	RYSTIGGO
Nombres del medicamento	RYSTIGGO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SAMSCA
Nombres del medicamento	SAMSCA, TOLVAPTAN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El tratamiento con el medicamento solicitado se inició (o reinició) en el hospital.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	30 días
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SANDOSTATIN LAR
Nombres del medicamento	SANDOSTATIN LAR DEPOT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Control tumoral de timomas y carcinomas tímicos, control tumoral de tumores neuroendocrinos (NET) de páncreas, tracto gastrointestinal, pulmón, timo, gastrinoma primario no reseado, NET de grado 3 bien diferenciados, feocromocitoma/paraganglioma.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acromegalia, inicial: 1) El paciente tiene un alto nivel de factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) previo al tratamiento para su edad y/o sexo según el intervalo de referencia del laboratorio, Y 2) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o parcial a la cirugía o la radioterapia O existe un motivo clínico por el que el paciente no se ha sometido a cirugía o radioterapia. Para acromegalia, continuación del tratamiento: El nivel de IGF-1 del paciente ha disminuido o se ha normalizado desde el inicio del tratamiento. El medicamento solicitado se utilizará para control de tumores en cualquiera de las siguientes situaciones: 1) Tumor neuroendocrino (NET) del tracto gastrointestinal o del páncreas en pacientes con enfermedad avanzada locorregional recidivante y/o enfermedad metastásica a distancia, O 2) NET del timo o del pulmón en pacientes con enfermedad locorregional irreseable y/o enfermedad metastásica a distancia, O 3) Gastrinoma primario no reseado, O 4) NET bien diferenciado de grado 3 no reseable localmente avanzado o metastásico con biología favorable (por ejemplo, ki-67 relativamente bajo [menos del 55%] y tomografía por emisión de positrones [PET] positiva para el receptor de somatostatina [SSTR]), O 5) Timomas o carcinomas tímicos cuando se cumplan los siguientes criterios: a) Enfermedad localmente avanzada o metastásica O b) Postoperatorio tras resección tumoral, O 6) Feocromocitomas o paragangliomas cuando se cumplan los siguientes criterios: a) Localmente irreseables O b) Enfermedad metastásica a distancia.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SAPHNELO
Nombres del medicamento	SAPHNELO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado no se utilizará en combinación con otros tratamientos biológicos. Para el lupus eritematoso sistémico (SLE) de moderado a grave: 1) El paciente cumple uno de los siguientes criterios: a) el paciente está recibiendo un régimen terapéutico estándar estable (por ejemplo, corticosteroides, antipalúdicos o NSAID), O b) el paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación al régimen terapéutico estándar para SLE, Y 2) Para los nuevos inicios: el paciente no tiene nefritis lúpica activa grave ni lupus activo grave del sistema nervioso central.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SAPROPTERIN
Nombres del medicamento	JAVYGTOR, KUVAN, SAPROPTERIN DIHYDROCHLORI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para fenilcetonuria (PKU): En el caso de pacientes que aún no han recibido una prueba terapéutica del medicamento solicitado, el nivel de fenilalanina antes del tratamiento (incluso antes del tratamiento dietético) es superior a 6 mg/dL (360 micromol/L). En el caso de pacientes que hayan completado una prueba terapéutica del medicamento solicitado, este debe haber experimentado una mejoría (por ejemplo, reducción de los niveles de fenilalanina en sangre, mejoría de los síntomas neuropsiquiátricos).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 2 meses, todas las demás: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SARCLISA
Nombres del medicamento	SARCLISA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SAVELLA
Nombres del medicamento	SAVELLA, SAVELLA TITRATION PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al duloxetine o pregabalin.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SCEMBLIX
Nombres del medicamento	SCEMBLIX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide crónica (CML) en fase crónica: 1) el diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL Y 2) el paciente cumple uno de los siguientes requisitos: A) el paciente ha sido tratado previamente con 2 o más inhibidores de la tirosina cinasa (TKI), Y al menos uno de ellos era imatinib o dasatinib, O B) el paciente es positivo para la mutación T315I.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SEGLENTIS
Nombres del medicamento	SEGLENTIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el manejo del dolor agudo: 1) El paciente respondió inadecuadamente a un régimen de dos pastillas de tramadol y celecoxib, O 2) El paciente ha experimentado una intolerancia, o tiene una contraindicación causada por un ingrediente inactivo en tramadol genérico o celecoxib genérico.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SEROSTIM
Nombres del medicamento	SEROSTIM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con debilitamiento o caquexia: El medicamento solicitado se utiliza en combinación con el tratamiento antirretroviral. El paciente ha tenido una respuesta subóptima a por lo menos otro tratamiento para el debilitamiento o la caquexia (por ejemplo, megestrol, dronabinol, ciproheptadina o tratamiento con testosterona si es hipogonadal) o el paciente tiene una contraindicación o intolerancia a tratamientos alternativos. En caso de continuación del tratamiento, el paciente debe haber demostrado una respuesta al medicamento solicitado (es decir, el índice de masa corporal [BMI] ha aumentado o se ha estabilizado).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	12 semanas
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SIGNIFOR
Nombres del medicamento	SIGNIFOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SIGNIFOR LAR
Nombres del medicamento	SIGNIFOR LAR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acromegalia, inicial: 1) El paciente tiene un alto nivel de factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) previo al tratamiento para su edad y/o sexo según el intervalo de referencia del laboratorio, Y 2) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o parcial a la cirugía, O existe un motivo clínico por el que el paciente no se ha sometido a cirugía o radioterapia. Para acromegalia, continuación del tratamiento: El nivel de IGF-1 del paciente ha disminuido o se ha normalizado desde el inicio del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SILDENAFIL
Nombres del medicamento	REVATIO, SILDENAFIL CITRATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) La presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) La presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) Si la solicitud es para un adulto, la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SILDENAFIL INJ
Nombres del medicamento	REVATIO, SILDENAFIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) La presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) La presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) Si la solicitud es para un adulto, la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	El paciente estaba recibiendo previamente Revatio o sildenafil por vía oral, pero ahora es temporalmente incapaz de tomar medicamentos orales.
Grupo de autorización previa	SIRTURO
Nombres del medicamento	SIRTURO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en enfermedades infecciosas, o en consulta con este.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SITAVIG
Nombres del medicamento	SITAVIG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al famciclovir, alacyclovir o acyclovir oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SKYCLARYS
Nombres del medicamento	SKYCLARYS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para ataxia de Friedreich (FRDA): 1) El paciente tiene una mutación genética confirmada en el gen de la frataxina (FXN), Y 2) El paciente presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad (por ejemplo, debilidad muscular, disminución de la coordinación, caídas frecuentes). Para FRDA, continuación del tratamiento: El paciente ha experimentado una respuesta beneficiosa al tratamiento (por ejemplo, ralentización del deterioro clínico).
Restricciones de edad	El paciente tiene 16 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un médico especializado en ataxia de Friedreich o un neurólogo, o en consulta con estos.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SKYRIZI
Nombres del medicamento	SKYRIZI, SKYRIZI PEN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% de la superficie corporal o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SKYTROFA
Nombres del medicamento	SKYTROFA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Pacientes pediátricos con epífisis cerrada
Información médica requerida	Deficiencia de hormona de crecimiento (GHD) pediátrica, inicial: A) El paciente (pt) cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) menor de 2.5 años (yo) con altura (HT) antes del tratamiento (pretratamiento) más de 2 desviaciones estándar (SD) por debajo de la media y velocidad de crecimiento lenta O 2) 2.5 años o más Y uno de los siguientes: a) velocidad de HT 1 año pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media O b) pretratamiento de ht de más de 2 SD por debajo de la media y velocidad de ht 1 año más de 1 SD por debajo de la media, Y el paciente cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) falló con 2 pruebas de estimulación de la hormona del crecimiento (GH) pretratamiento (pico inferior a 10 ng/mL), 2) trastorno hipofisario/del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, defectos genéticos, anomalías estructurales adquiridas, anomalías estructurales congénitas) y factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media, O B) el paciente recibió un diagnóstico de GHD como neonato. GHD pediátrico, continuación del tratamiento: El paciente experimenta mejoría.
Restricciones de edad	-El paciente tiene 1 año de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SOGROYA
Nombres del medicamento	SOGROYA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Deficiencia de hormona de crecimiento pediátrica (GHD): Paciente pediátrico con epífisis cerrada
Información médica requerida	Para GHD adulto: El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes criterios: 1) fracasó en 2 pruebas de estimulación de GH pre-tx, O 2) factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) pre-tx más de 2 SD por debajo de la media, Y fracasó en una prueba de estimulación de GH pre-tx. (Nota: Las pruebas de estimulación incluyen: a) prueba de tolerancia a la insulina [ITT] [nivel máximo de GH inferior o igual a 5 ng/ml], o b) prueba de estimulación con Macrilen [nivel máximo de GH inferior a 2.8 ng/ml], o c) prueba de estimulación con glucagón [GST] [nivel máximo de GH inferior o igual a 3 ng/ml] para pacientes con un índice de masa corporal [BMI] de 25-30 kg/m ² y alta probabilidad previa a la prueba de deficiencia de la hormona del crecimiento [GHD] [p. ej., anomalías estructurales adquiridas] o un BMI inferior a 25 kg/m ² , O BMI inferior a 25 kg/m ² , o d) GST [nivel máximo de GH inferior o igual a 1 ng/ml] en un paciente con BMI 25-30 kg/m ² y baja probabilidad antes de la prueba de GHD o BMI superior a 30 kg/m ² , O 3) enfermedad hipotalámica-hipofisaria orgánica (p.ej., masa supraselar con cirugía previa e irradiación craneal) con 3 o más deficiencias hormonales hipofisarias, E IGF-1 pre tratamiento superior a 2 SD por debajo de la media, O 4) defectos hipotalámico-hipofisarios genéticos o estructurales, O 5) GHD de inicio en la infancia con anomalía congénita (genética o estructural) del hipotálamo/hipofisis/CNS.
Restricciones de edad	Deficiencia de hormona de crecimiento pediátrica (GHD): 2.5 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Para deficiencia de la hormona del crecimiento (GHD) en pacientes pediátricos: A) El paciente (pt) tiene una velocidad de altura (ht) de 1 año antes del tratamiento (pre-tx) más de 2 desviaciones estándar (SD) por debajo de la media O una ht pre-tx más de 2 SD por debajo de la media y una velocidad de ht de 1 año más de 1 SD por debajo de la media Y el pt cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) falló con 2 pruebas de estimulación de la hormona del crecimiento (GH) pretratamiento (pico inferior a 10 ng/mL), 2) trastorno hipofisario/del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, defectos genéticos, anomalías estructurales adquiridas, anomalías estructurales congénitas) y factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) pretratamiento más de 2 SD por debajo de la media, O B) el paciente recibió un diagnóstico de GHD como neonato.

Grupo de autorización previa	SOGROYA
Nombres del medicamento	SOLIRIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) (inicial): 1) el diagnóstico de PNH se confirmó mediante la detección de una deficiencia de proteínas ancladas a glicosilfosfatidilinositol (GPI-AP) demostrada por: a) al menos un 5% de células PNH o b) al menos un 51% de células polimorfonucleares (PMN) deficientes en GPI-AP Y 2) se utiliza la citometría de flujo para demostrar la deficiencia de GPI-AP. En caso de PNH (continuación): 1) no hay indicios de toxicidad inaceptable o evolución de la enfermedad mientras esté en el régimen actual Y 2) el paciente ha respondido positivamente al tratamiento (por ejemplo, mejora en los niveles de hemoglobina, normalización de los niveles de lactato deshidrogenasa [LDH]). Para el síndrome urémico hemolítico atípico (SHUa) (inicial): la enfermedad no está causada por Escherichia coli productora de toxina Shiga. Para el SHUa (continuación): 1) no hay indicios de toxicidad inaceptable o evolución de la enfermedad mientras esté en el régimen actual, Y 2) el paciente ha respondido positivamente al tratamiento (por ejemplo, normalización de los niveles de lactato deshidrogenasa [LDH]). En caso de miastenia grave generalizada (continuación): 1) no hay indicios de toxicidad inaceptable o evolución de la enfermedad mientras esté en el régimen actual, Y 2) el paciente ha respondido positivamente al tratamiento (por ejemplo, mejora en la puntuación MG-ADL). Para trastorno de espectro neuromielitis óptica (continuación): 1) no hay indicios de toxicidad inaceptable o evolución de la enfermedad mientras esté en el régimen actual, Y 2) el paciente ha respondido positivamente al tratamiento (por ejemplo, reducción en la cantidad de recaídas).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 6 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SOMATULINE DEPOT
Nombres del medicamento	SOMATULINE DEPOT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Control tumoral de tumores neuroendocrinos (NET) de pulmón, timo o gastrinoma primario no resecado, tumores neuroendocrinos bien diferenciados de grado 3 que no son de origen gastroenteropancreático, feocromocitoma/paraganglioma.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acromegalia, inicial: 1) El paciente tiene un alto nivel de factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) previo al tratamiento para su edad y/o sexo según el intervalo de referencia del laboratorio, Y 2) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o parcial a la cirugía o la radioterapia O existe un motivo clínico por el que el paciente no se ha sometido a cirugía o radioterapia. Para acromegalia, continuación del tratamiento: El nivel de IGF-1 del paciente ha disminuido o se ha normalizado desde el inicio del tratamiento. Para el control tumoral de tumores neuroendocrinos (NET) de timo o pulmón: El paciente tiene enfermedad locorregional irresecable, recurrente y/o metastásica a distancia. Para el control tumoral de NET bien diferenciados de grado 3 no resecables localmente avanzados o metastásicos (que no son de origen gastroenteropancreático): El paciente tiene una biología favorable (por ejemplo, Ki-67 relativamente bajo [menos del 55%] e imágenes de tomografía por emisión de positrones [PET] basadas en receptores de somatostatina [SSTR] consideradas positivas). Para el control tumoral de feocromocitomas o paragangliomas: El paciente tiene enfermedad localmente irresecable o distante metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SOMAVERT
Nombres del medicamento	SOMAVERT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acromegalia, inicial: 1) El paciente tiene un alto nivel de factor de crecimiento insulinoide 1 (IGF-1) previo al tratamiento para su edad y/o sexo según el intervalo de referencia del laboratorio, Y 2) El paciente ha tenido una respuesta inadecuada o parcial a la cirugía o la radioterapia O existe un motivo clínico por el que el paciente no se ha sometido a cirugía o radioterapia. Para acromegalia, continuación del tratamiento: El nivel de IGF-1 del paciente ha disminuido o se ha normalizado desde el inicio del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SPEVIGO
Nombres del medicamento	SPEVIGO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para brotes de psoriasis pustulosa generalizada: El paciente tiene antecedentes conocidos de psoriasis pustulosa generalizada (ya sea recidivante [más de 1 episodio] o persistente [más de 3 meses]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SPRAVATO
Nombres del medicamento	SPRAVATO 56MG DOSE, SPRAVATO 84MG DOSE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para depresión resistente al tratamiento (TRD), tratamiento inicial: 1) Diagnóstico confirmado de trastorno depresivo mayor grave (episodio único o recurrente) mediante escalas de valoración estandarizadas que midan de forma fiable los síntomas depresivos (por ejemplo, Beck's Depression Inventory [BDI], Hamilton Depression Rating Scale [HDRS], Montgomery-Asberg Depression Rating Scale [MADRS], etc.), Y 2) Respuesta inadecuada con una dosis terapéutica o intolerancia a por lo menos dos agentes antidepresivos durante el episodio depresivo actual, Y 3) El paciente está recibiendo actualmente tratamiento con un antidepresivo oral. Para TRD, continuación del tratamiento: Mejoría o mejoría sostenida de los síntomas depresivos con respecto a los valores iniciales, evidenciada por escalas de valoración estandarizadas que miden de forma fiable los síntomas depresivos. Para trastorno depresivo mayor (MDD) con ideas o conducta suicida aguda: 1) Diagnóstico confirmado de trastorno depresivo mayor grave (episodio único o recurrente) mediante escalas de valoración estandarizadas que midan de forma fiable los síntomas depresivos (por ejemplo, Beck's Depression Inventory [BDI], Hamilton Depression Rating Scale [HDRS], Montgomery-Asberg Depression Rating Scale [MADRS], etc.), Y 2) El paciente recibirá el medicamento solicitado en combinación con un antidepresivo oral.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	TRD, Inicio: 3 meses. TRD, continuación: año del plan. MDD: 1 mes
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	SPRYCEL
Nombres del medicamento	SPRYCEL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumor del estroma gastrointestinal (GIST), condrosarcoma metastásico, leucemia linfoblástica aguda (ALL) de células T y B-ALL tipo Filadelfia (Ph), neoplasias mieloides y/o linfoides con eosinofilia y reordenamiento ABL1 en fase crónica o blástica
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la leucemia mieloide crónica (CML), incluidos los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: 1) El diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL, Y 2) Si el paciente experimentó resistencia a un inhibidor alternativo de la tirosina cinasa, el paciente es negativo para todas las mutaciones siguientes: T315I/A, F317L/V/I/C y V299L. Para leucemia linfoblástica aguda (ALL), el paciente tiene un diagnóstico de uno de los siguientes: 1) ALL con cromosoma Philadelphia positivo, lo que incluye pacientes con han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: diagnóstico confirmado mediante la detección del cromosoma Ph o del gen BCR-ABL, y si el paciente experimentó resistencia a un inhibidor alternativo de la tirosina cinasa, el paciente es negativo para todas las mutaciones siguientes: T315I/A, F317L/V/I/C, y V299L, O 2) B-ALL tipo Ph con fusión quinasa de clase ABL, O 3) ALL de células T en recaída o refractaria con fusión quinasa de clase ABL. Para GIST, 1) el paciente cumple todos los criterios siguientes: A) la enfermedad es irreseccable, recurrente/progresiva o metastásica, B) el paciente ha recibido tratamiento previo con imatinib o avapritinib, Y C) los pacientes son positivos para mutaciones del exón 18 de PDGFRA, O 2) el medicamento solicitado se está utilizando para paliar los síntomas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	STELARA
Nombres del medicamento	STELARA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para psoriasis en placas de moderada a grave (sólo nuevos inicios): 1) Al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a la fototerapia (por ejemplo, UVB, PUVA) o al tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina, O b) el tratamiento farmacológico con MTX, ciclosporina o acitretina está contraindicado, O c) el paciente padece una psoriasis grave que justifica el uso de un biológico como tratamiento de primera línea (es decir, tiene afectado al menos el 10% del BSA o zonas corporales cruciales [p. ej., manos, pies, cara, cuello, cuero cabelludo, genitales/glándula, zonas intertriginosas]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	STIVARGA
Nombres del medicamento	STIVARGA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumores del estroma gastrointestinal (GIST) progresivos, osteosarcoma, glioblastoma, angiosarcoma, sarcoma de partes blandas retroperitoneal/intraabdominal, rabdomiosarcoma, sarcomas de partes blandas de las extremidades, pared corporal, cabeza y cuello.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para tumores del estroma gastrointestinal: La enfermedad es progresiva, localmente avanzada, irreseccable o metastásica. Para el cáncer colorrectal: La enfermedad es avanzada o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	STRENSIQ
Nombres del medicamento	STRENSIQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la hipofosfatasa de inicio perinatal/infantil y juvenil: 1) El paciente presenta signos y/o síntomas clínicos de hipofosfatasa (p. ej, hipomineralización generalizada con rasgos raquíuticos, deformidades torácicas y fracturas costales, problemas respiratorios, hipercalcemia, retraso del crecimiento, dolor óseo/articular, convulsiones), Y 2) El inicio de la enfermedad fue perinatal/infantil o juvenil, Y 3) El diagnóstico se confirmó por la presencia de mutaciones en el gen ALPL detectadas mediante pruebas genéticas moleculares ALPL, O el diagnóstico se apoyó en TODO lo siguiente: a) imágenes radiográficas que demuestran anomalías esqueléticas (por ejemplo, raquitismo infantil, pérdida ósea alveolar, defectos óseos focales de las metáfisis, fracturas metatarsales por estrés), b) nivel bajo de fosfatasa alcalina sérica (ALP) según el intervalo de referencia específico para el sexo y la edad del laboratorio que realiza la prueba y c) nivel elevado de sustrato de fosfatasa alcalina tisular no específica (TNALP) (es decir, nivel sérico de piridoxal 5'-fosfato [PLP], nivel sérico o urinario de fosfoetanolamina [PEA], nivel urinario de pirofosfato inorgánico [PPI]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SUCRAID
Nombres del medicamento	SUCRAID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de deficiencia congénita de sucrasa-isomaltasa: 1) El diagnóstico se confirmó mediante biopsia del intestino delgado, O 2) El diagnóstico se confirmó mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SUNOSI
Nombres del medicamento	SUNOSI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de somnolencia excesiva asociada a la narcolepsia, solicitud inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en laboratorio del sueño, Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un medicamento promotor de la vigilia del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo), O tiene una contraindicación que prohibiría probar un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo). En caso de somnolencia excesiva asociada a la apnea obstructiva del sueño (OSA), solicitud inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante una polisomnografía, y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento o intolerancia a por lo menos un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo), O tiene una contraindicación que le prohibiría probar un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo). Si la solicitud es para continuar el tratamiento, entonces el paciente experimentó una disminución de la somnolencia diurna con narcolepsia o una disminución de la somnolencia diurna con apnea obstructiva del sueño (OSA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en trastornos del sueño o neurólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SUSVIMO
Nombres del medicamento	SUSVIMO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	SUTENT
Nombres del medicamento	SUNITINIB MALATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma de tiroides (folicular, medular, papilar y de células de Hurthle), sarcoma de partes blandas (subtipos angiosarcoma, tumor fibroso solitario y sarcoma alveolar de partes blandas), cordoma recurrente, carcinoma tímico, neoplasias linfoides, mieloides o de linaje mixto con eosinofilia, feocromocitoma, paraganglioma, tumor del estroma gastrointestinal (GIST) (enfermedad irresecable, recurrente/progresiva o metastásica tras evolución con tratamientos aprobados, GIST no resecables con deficiencia de succinato deshidrogenasa (SDH) y uso para paliación de síntomas si se ha tolerado previamente y es eficaz).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma de células renales, el paciente cumple uno de los criterios siguientes: 1) la enfermedad es recidivante, avanzada o está en estadio IV, O 2) el medicamento solicitado se utiliza como tratamiento complementario para pacientes con alto riesgo de RCC recidivante tras una nefrectomía. Para tumor del estroma gastrointestinal (GIST): el paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) el medicamento solicitado se utilizará tras la evolución de la enfermedad o la intolerancia al imatinib, 2) la enfermedad es irresecable, recurrente/progresiva o metastásica, Y el paciente no ha respondido a un tratamiento aprobado por la FDA (por ejemplo, imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib), 3) el medicamento solicitado se utilizará para GIST no resecables con deficiencia de succinato deshidrogenasa (SDH), O 4) el medicamento solicitado se utilizará para paliar los síntomas si se ha tolerado previamente y es eficaz. Para neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia: 1) la enfermedad tiene un reordenamiento FLT3, Y 2) la enfermedad está en fase crónica o blástica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SYFOVRE
Nombres del medicamento	SYFOVRE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	SYMDEKO
Nombres del medicamento	SYMDEKO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para fibrosis quística: El medicamento solicitado no se utilizará en combinación con otros medicamentos que contengan ivacaftor.
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SYMLIN
Nombres del medicamento	SYMLINPEN 120, SYMLINPEN 60
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	SYMPAZAN
Nombres del medicamento	SYMPAZAN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Convulsiones asociadas al síndrome de Dravet
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut (LGS): 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	SYNAREL
Nombres del medicamento	SYNAREL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica necesaria	En caso de pubertad precoz central (CPP): Los pacientes que no estén recibiendo tratamiento en la actualidad deben cumplir todos los criterios siguientes: 1) El diagnóstico de CPP se confirmó mediante una respuesta puberal a una prueba con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) O un nivel puberal de un ensayo de hormona luteinizante (LH) de tercera generación, Y 2) La evaluación de la edad ósea frente a la edad cronológica apoya el diagnóstico de CPP, Y 3) El inicio de las características sexuales secundarias se produjo antes de los 8 años de edad para las pacientes femeninas O antes de los 9 años de edad para los pacientes masculinos. Para el tratamiento de endometriosis: El paciente no ha recibido ya más de 6 meses de tratamiento con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	CPP: El paciente debe tener menos de 12 años si es mujer y menos de 13 años si es hombre. Endometriosis: 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TABRECTA
Nombres del medicamento	TABRECTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC recurrente, avanzado o metastásico: El tumor es positivo para la mutación de omisión del exón 14 de la transición mesenquimal-epitelial (MET).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TADALAFIL (PAH)
Nombres del medicamento	ADCIRCA, ALYQ, TADALAFIL, TADLIQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica exigida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (PAH) (Grupo de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevas PAH: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TAFINLAR
Nombres del medicamento	TAFINLAR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma de tiroides (carcinoma papilar, carcinoma folicular y carcinoma de células de Hurthle), cáncer del sistema nervioso central (CNS) (es decir, oligodendroglioma, astrocitoma, glioblastoma), cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma extrahepático, colangiocarcinoma intrahepático, histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Erdheim-Chester, cáncer de ovario, cáncer de trompas de Falopio y cáncer peritoneal primario.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer del sistema nervioso central (CNS) (es decir, glioma, oligodendroglioma, glioblastoma, astrocitoma): 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y el medicamento solicitado se utilizará en combinación con trametinib. Para el melanoma: 1) El tumor es positivo para la mutación activadora BRAF V600 (por ejemplo, V600E o V600K), Y 2) El medicamento solicitado se utilizará como agente único o en combinación con dabrafenib, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará para cualquiera de los siguientes casos: a) enfermedad irreseca, reseca limitada o metastásica, b) tratamiento sistémico complementario. Para carcinoma pulmonar no microcítico: 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) El medicamento solicitado se utilizará como agente único o en combinación con trametinib. En caso de carcinoma tiroideo papilar, folicular y de células de Hurthle: 1) El tumor es BRAF-positivo, Y 2) La enfermedad no es susceptible a tratamiento con yodo radiactivo (RAI). Para histiocitosis de células de Langerhans y enfermedad de Erdheim-Chester: La enfermedad es positiva para una mutación BRAF V600E. Para cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático y colangiocarcinoma extrahepático: 1) La enfermedad es positiva para la mutación BRAF V600E, Y 2) La enfermedad es irreseca o metastásica, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con trametinib. Para tumores sólidos: 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con trametinib. Para cáncer de ovario, cáncer de trompas de Falopio y cáncer peritoneal primario: 1) La enfermedad es positiva para la mutación BRAF V600E, Y 2) La enfermedad es persistente o recurrente, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con trametinib.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TAGRISSE
Nombres del medicamento	TAGRISSE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente sensibilizante con mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), metástasis cerebrales de NSCLC sensibilizante con mutación positiva del EGFR, metástasis leptomeníngicas de NSCLC con mutación positiva del EGFR.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC: el medicamento solicitado se utiliza en cualquiera de las siguientes situaciones: 1) El paciente cumple los dos criterios siguientes: a) el paciente tiene un NSCLC metastásico, avanzado o recurrente (incluidas metástasis cerebrales y/o leptomeníngicas de NSCLC) y b) el paciente tiene una mutación EGFR sensibilizante, O 2) El paciente cumple los dos criterios siguientes: a) la solicitud es para tratamiento complementario de NSCLC tras resección tumoral y b) el paciente tiene enfermedad con mutación EGFR positiva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TAKHZYRO
Nombres del medicamento	TAKHZYRO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de prevención de crisis agudas de angioedema debidas a angioedema hereditario (HAE): El paciente cumple uno de los siguientes requisitos: 1) el paciente padece angioedema hereditario (HAE) con deficiencia o disfunción del inhibidor de C1 confirmada mediante pruebas de laboratorio O 2) el paciente padece angioedema hereditario con inhibidor de C1 normal confirmado mediante pruebas de laboratorio y una de las siguientes circunstancias: a) el paciente ha dado positivo para una mutación de los genes F12, angiopoyetina-1, plasminógeno, kininógeno-1 (KNG1), heparán sulfato-glucosamina 3-O-sulfotransferasa 6 (HS3ST6) o mioferlina (MYOF) O b) el paciente tiene antecedentes familiares de angioedema y el angioedema ha sido refractario a un tratamiento con dosis altas de antihistamínicos durante al menos un mes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un inmunólogo, alergólogo o reumatólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TALTZ
Nombres del medicamento	TALTZ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de psoriasis en placas de moderada a grave (sólo para nuevos tratamientos): 1) al menos el 3% de la superficie corporal (BSA) está afectada O zonas cruciales del cuerpo (por ejemplo, pies, manos, cara, cuello, ingle, zonas intertriginosas) están afectadas en el momento del diagnóstico, Y 2) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos: adalimumab-aacf, Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab), Idacio (adalimumab-aacf), Otezla (apremilast), Skyrizi (risankizumab-rzaa), Stelara (ustekinumab). En caso de espondilitis anquilosante activa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos: adalimumab-aacf, Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab), Idacio (adalimumab-aacf), Rinvoq (upadacitinib), Xeljanz (tofacitinib)/Xeljanz XR (tofacitinib de liberación prolongada). En caso de artritis psoriásica activa (PsA) (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos: adalimumab-aacf, Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab), Idacio (adalimumab-aacf), Otezla (apremilast), Rinvoq (upadacitinib), Skyrizi (risankizumab-rzaa), Stelara (ustekinumab), Xeljanz (tofacitinib)/Xeljanz XR (tofacitinib de liberación prolongada). En caso de espondiloartritis axial activa no radiográfica (sólo para nuevos tratamientos): el paciente cumple cualquiera de los siguientes criterios: 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento con al menos un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (NSAID), O 2) el paciente ha experimentado intolerancia o tiene una contraindicación al NSAID.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TALZENNA
Nombres del medicamento	TALZENNA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recurrente con mutación de la línea germinal del gen de susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TARGRETIN TÓPICA
Nombres del medicamento	BEXAROTENE, TARGRETIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Micosis fungoide (MF)/Síndrome de Sezary (SS) en estadio 2 o superior, leucemia/linfoma de células T del adulto (ATLL) crónico o latente, linfoma cutáneo primario de la zona marginal, linfoma cutáneo primario del centro folicular.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TARPEYO
Nombres del medicamento	TARPEYO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para pacientes con nefropatía primaria por inmunoglobulina A (IgAN) con riesgo de evolución de la enfermedad: 1) el paciente está recibiendo una dosis estable de un inhibidor del sistema renina-angiotensina (RAS) (por ejemplo, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina [ACE] o un bloqueante de los receptores de angiotensina [ARB]) al máximo tolerado, o el paciente ha experimentado una intolerancia o tiene una contraindicación a los inhibidores del RAS Y 2) el paciente ha experimentado una intolerancia a un glucocorticoide oral (por ejemplo, prednisona).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	10 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TASCENSO
Nombres del medicamento	TASCENSO ODT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TASIGNA
Nombres del medicamento	TASIGNA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo (Ph+ ALL), tumores del estroma gastrointestinal (GIST), neoplasias mieloides y/o linfoides con eosinofilia y reordenamiento ABL1 en fase crónica o blástica, sinovitis villonodular pigmentada/tumor tenosinovial de células gigantes.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide crónica (CML), incluidos los pacientes con diagnóstico reciente de CML y los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: 1) El diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL, 2) el paciente ha experimentado resistencia o intolerancia a imatinib o dasatinib, Y 3) si el paciente ha experimentado resistencia a un inhibidor alternativo de la tirosina cinasa para la CML, el paciente es negativo para las mutaciones T315I, Y253H, E255K/V y F359V/C/I. Para leucemia linfoblástica aguda (ALL), incluidos los pacientes que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas: 1) El diagnóstico se confirmó mediante la detección del cromosoma Filadelfia o del gen BCR-ABL, Y 2) Si el paciente experimentó resistencia a un inhibidor alternativo de la tirosina cinasa de ALL, es T315I, Y253H, E255K/V, F359V/C/I Y G250E negativo. Para tumor del estroma gastrointestinal (GIST), el paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) la enfermedad es irresecable, recurrente/progresiva o metastásica, Y el paciente ha avanzado con al menos dos tratamientos aprobados (por ejemplo, imatinib, sunitinib, dasatinib, regorafenib, ripretinib), O 2) el medicamento solicitado se receta para paliar los síntomas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TAVALISSE
Nombres del medicamento	TAVALISSE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trombocitopenia inmune (ITP) crónica: 1) Para nuevos comienzos: el paciente cumple con todos los siguientes criterios: a) el paciente ha tenido una respuesta inadecuada o es intolerante a un tratamiento previo (por ejemplo, con corticosteroides, inmunoglobulinas, agonistas del receptor de la trombopoyetina), Y b) El recuento de plaquetas no transfundidas en cualquier momento anterior al inicio del medicamento solicitado es inferior a 30,000/mcL O de 30,000 a 50,000/mcL con hemorragia sintomática o factores de riesgo de hemorragia (por ejemplo, someterse a un procedimiento médico u odontológico en el que se prevea pérdida de sangre, comorbilidades como úlcera péptica e hipertensión, tratamiento anticoagulante, profesión o estilo de vida que predisponga al paciente a sufrir traumatismos). 2) En caso de continuación del tratamiento, la respuesta del recuento plaquetario al medicamento solicitado debe cumplir uno de los criterios siguientes: a) el recuento plaquetario actual es inferior o igual a 200,000/mcLm, O b) el recuento plaquetario actual es superior a 200,000/mcL e inferior o igual a 400,000/mcL y la dosificación se ajustará a un recuento plaquetario suficiente para evitar hemorragias clínicamente importantes.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 12 semanas, reautorización: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TAVNEOS
Nombres del medicamento	TAVNEOS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la continuación del tratamiento de la vasculitis grave asociada a autoanticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos (ANCA): el paciente ha experimentado beneficios con el tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TAZAROTENE
Nombres del medicamento	TAZAROTENE, TAZORAC
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para psoriasis en placas, el paciente cumple los siguientes criterios: 1) el paciente tiene menos o igual al 20 por ciento de superficie corporal (BSA) afectada, Y 2) el paciente respondió inadecuadamente al tratamiento o intolerancia a por lo menos un corticosteroide tópico O tiene una contraindicación que le prohibiría probar corticosteroides tópicos.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TAZVERIK
Nombres del medicamento	TAZVERIK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	Sarcoma epitelioides: 16 años de edad o más, linfoma folicular: 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TECENTRIQ
Nombres del medicamento	TECENTRIQ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Agente único de mantenimiento para el cáncer de pulmón microcítico extensivo tras un tratamiento combinado con etopósido y carboplatino, terapia posterior para el mesotelioma peritoneal, mesotelioma pericárdico y mesotelioma de testículo tunica vaginalis, carcinoma primario de la uretra.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma primario de uretra: 1) El paciente no es elegible para tratamiento con cisplatino y los tumores expresan PD-L1, O 2) El paciente no es elegible para cualquier quimioterapia que contenga platino. Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC): 1) el paciente tiene enfermedad recurrente, avanzada o metastásica Y el medicamento solicitado se utilizará como cualquiera de los siguientes: a) tratamiento de primera línea de tumores con alta expresión de PD-L1 (definida como PD-L1 teñido en más o igual al 50 por ciento de las células tumorales o células inmunitarias infiltrantes del tumor [CI] teñidas con PD-L1 que cubran más o igual al 10 por ciento del área tumoral) y sin aberraciones tumorales genómicas EGFR o ALK, b) utilizado en combinación con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, o en combinación con carboplatino y paclitaxel unido a albúmina para CPNM no escamoso, o c) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento subsiguiente o tratamiento para continuar el mantenimiento, O 2) el paciente tiene enfermedad en estadio II a IIIA, Y el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento complementario tras resección y quimioterapia complementario para tumores con expresión de PD-L1 en más o igual al 1 por ciento de las células tumorales. Para el carcinoma hepatocelular: el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento inicial combinado con bevacizumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TECFIDERA
Nombres del medicamento	DIMETHYL FUMARATE, DIMETHYL FUMARATE STARTER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TECVAYLI
Nombres del medicamento	TECVAYLI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TEGSEDI
Nombres del medicamento	TEGSEDI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para la polineuropatía de amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina, tratamiento inicial: el paciente es positivo para una mutación del gen TTR y presenta una manifestación clínica de la enfermedad. En caso de polineuropatía de amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina, continuación del tratamiento: el paciente demuestra una respuesta beneficiosa al tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TEMAZEPAM
Nombres del medicamento	RESTORIL, TEMAZEPAM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de insomnio a corto plazo: 1) El médico recetante debe reconocer que el beneficio del tratamiento con este medicamento recetado supera los riesgos potenciales para el paciente. (Nota: La Sociedad Americana de Geriátrica identifica el uso de este medicamento como potencialmente inapropiado en adultos mayores, lo que significa que es mejor evitarlo, recetarlos a dosis reducidas o utilizarlos con precaución o cuidadosamente controlado). Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al doxepin (3 mg o 6 mg).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Esta Autorización Previa sólo se aplica a pacientes de 65 años de edad o mayores.

Grupo de autorización previa	TEPEZZA
Nombres del medicamento	TEPEZZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TEPMETKO
Nombres del medicamento	TEPMETKO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC recurrente, avanzado o metastásico: El tumor es positivo para la mutación de omisión del exón 14 de la transición mesenquimal-epitelial (MET).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TEPMETKO
Nombres del medicamento	TERIPARATIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de osteoporosis posmenopáusica, la paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) antecedentes de fractura por fragilidad, O 2) puntuación T pretratamiento inferior o igual a -2.5 o puntuación T pretratamiento superior a -2.5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura (FRAX) Y el paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) indicadores de mayor riesgo de fractura (por ejemplo, edad avanzada, fragilidad, tratamiento con glucocorticoides, puntuaciones T muy bajas o mayor riesgo de caídas), o b) el paciente no respondió a un tratamiento previo con un tratamiento inyectable para la osteoporosis o no lo tolera, o c) el paciente ha sido sometido a un ensayo con bifosfonatos orales de al menos 1 año de duración o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral. En caso de osteoporosis primaria o hipogonadal en hombres: el paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) antecedentes de fractura vertebral o de cadera osteoporótica, O 2) puntuación T pretratamiento inferior o igual a -2.5 o puntuación T pretratamiento superior a -2.5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de acuerdo a FRAX, Y el paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) el paciente no respondió a un tratamiento previo con un tratamiento inyectable para la osteoporosis o no lo tolera, o b) el paciente ha probado bifosfonatos orales por lo menos durante un 1 año o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Inicio: 24 meses; Continuación: Año del plan
Otros criterios	En caso de osteoporosis inducida por glucocorticoides: El paciente probó bifosfonato oral por lo menos durante un 1 año, a menos que tenga una contraindicación o intolerancia a un bifosfonato oral, Y el paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: 1) el paciente tiene antecedentes de fractura por fragilidad, O 2) una puntuación T previa al tratamiento inferior o igual a -2,5, O 3) una puntuación T previa al tratamiento superior a -2,5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura FRAX previa al tratamiento. Continuación del tratamiento: Si el paciente ha recibido un tratamiento igual o superior a 24 meses con cualquier análogo de la hormona paratiroidea: 1) El paciente sigue teniendo o ha vuelto a tener un alto riesgo de fractura, Y 2) El beneficio del tratamiento con este medicamento recetado supera los riesgos potenciales para este paciente.

Grupo de autorización previa	TESTOSTERONE CYPIONATE INJ
Nombres del medicamento	DEPO-TESTOSTERONE, TESTOSTERONE CYPIONATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de disforia de género: El paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TESTOSTERONE ENANTHATE INJ
Nombres del medicamento	TESTOSTERONE ENANTHATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de disforia de género: El paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TETRABENAZINE
Nombres del medicamento	TETRABENAZINE, XENAZINE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Trastornos de tics, discinesia tardía, hemibalismo, corea no asociada a enfermedad de Huntington.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de discinesia tardía y el tratamiento de corea asociada a la enfermedad de Huntington: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o una reacción adversa intolerable a la deutetrabenazina.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TETRACYCLINE
Nombres del medicamento	TETRACYCLINE HYDROCHLORID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente utilizará el medicamento solicitado por vía oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	THALOMID
Nombres del medicamento	THALOMID
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Anemia asociada a mielofibrosis, estomatitis aftosa relacionada con el SIDA, sarcoma de Kaposi, enfermedad de injerto contra huésped crónica, enfermedad de Crohn, enfermedad de Castleman multicéntrica, enfermedad de Rosai-Dorfman, histiocitosis de células de Langerhans
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TIBSOVO
Nombres del medicamento	TIBSOVO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Condrosarcoma convencional (grados 1-3) o indiferenciado. Leucemia mieloide aguda (AML) recién diagnosticada si tiene entre 60 y 74 años y no presenta comorbilidades.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente tiene la enfermedad susceptible a mutación de la enzima isocitrato deshidrogenasa-1 (IDH1). En caso de leucemia mieloide aguda (AML): 1) el paciente está recién diagnosticado con AML y cumple uno de los siguientes criterios: a) tiene 75 años de edad o más, b) presenta comorbilidades que imposibilita la quimioterapia intensiva de inducción, O c) tiene 60 años o más y rechaza la quimioterapia intensiva de inducción O 2) tiene 60 años o más y el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de postinducción tras la respuesta al tratamiento de inducción con el medicamento solicitado, O 3) el paciente tiene AML en recaída o refractaria. Para colangiocarcinoma localmente avanzado, irreseccable o metastásico: el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior para la evolución del tratamiento sistémico o después.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TIGLUTIK
Nombres del medicamento	TEGLUTIK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	1) El paciente requiere la administración del medicamento solicitado a través de una sonda para gastrostomía endoscópica percutánea (sonda PEG), O 2) El paciente tiene dificultad para tragar formas farmacéuticas orales sólidas (por ejemplo, comprimidos).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TIVDAK
Nombres del medicamento	TIVDAK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TLANDO
Nombres del medicamento	TLANDO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de disforia de género: El paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TOBI INHALADOR
Nombres del medicamento	TOBI PODHALER
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Bronquiectasia sin fibrosis quística
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para bronquiectasias con fibrosis quística y sin fibrosis quística: 1) Pseudomonas aeruginosa está presente en los cultivos de las vías respiratorias del paciente, O 2) El paciente tiene antecedentes de infección o colonización por pseudomonas aeruginosa en las vías respiratorias.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TOBRAMYCIN
Nombres del medicamento	BETHKIS, KITABIS PAK, TOBI, TOBRAMYCIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Bronquiectasia sin fibrosis quística
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para bronquiectasias con fibrosis quística y sin fibrosis quística: 1) Pseudomonas aeruginosa está presente en los cultivos de las vías respiratorias del paciente, O 2) El paciente tiene antecedentes de infección o colonización por pseudomonas aeruginosa en las vías respiratorias.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	TOLSURA
Nombres del medicamento	TOLSURA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	LIDOCAINA TÓPICA
Nombres del medicamento	GLYDO, LIDOCAINE, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	1) El medicamento solicitado se utiliza para anestesia tópica, Y 2) Si el medicamento solicitado se utilizará como parte de un producto compuesto, entonces todos los ingredientes activos del producto compuesto están aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para uso tópico.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	3 meses
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	TESTOSTERONAS TÓPICAS
Nombres del medicamento	ANDROGEL PUMP, NATESTO, TESTIM, TESTOSTERONE, TESTOSTERONE PUMP, VOGELXO, VOGELXO PUMP
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de disforia de género: El paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TRETINOIN TÓPICA
Nombres del medicamento	ALTRENO, ATRALIN, RETIN-A, RETIN-A MICRO, RETIN-A MICRO PUMP, TRETINOIN, TRETINOIN MICROSPHERE, TWYNEO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TRAZIMERA
Nombres del medicamento	TRAZIMERA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, del cáncer de mama con HER2 positivo recidivante o avanzado irresecable, de metástasis leptomeningeas del cáncer de mama con HER2 positivo, de metástasis cerebrales del cáncer de mama con HER2 positivo, del adenocarcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica con HER2 positivo, del carcinoma uterino seroso avanzado, recidivante o metastásico con HER2-positivo, cáncer colorrectal con HER2 amplificado, y RAS y BRAF no mutados (incluido el adenocarcinoma apendicular), tumor recidivante de glándulas salivales con HER2 positivo, carcinoma hepatobiliar no resecable o metastásico con HER2-positivo (cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático), adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, no resecable o recidivante con sobreexpresión HER2 positiva.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) la enfermedad es HER2-amplificada y RAS y BRAF no mutados (WT) y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab, tucatinib o lapatinib y 3) el paciente no ha recibido tratamiento previo con un inhibidor de HER2. Para carcinoma hepatobiliar: 1) la enfermedad es HER2-positiva, Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con pertuzumab.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	TRELSTAR
Nombres del medicamento	TRELSTAR MIXJECT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género, supresión ovárica en cáncer de mama
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para disforia de género, el paciente cumple con uno de los criterios siguientes (1 o 2): 1) el medicamento solicitado se utiliza para suprimir la pubertad y el paciente se encuentra en el estadio 2 o superior de Tanner, O 2) el paciente se encuentra en proceso de transición de género, y recibirá el medicamento solicitado de forma concomitante con hormonas de reafirmación de género. Para cáncer de mama: 1) el medicamento solicitado se utiliza para la supresión ovárica en pacientes premenopáusicas y 2) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con tratamiento endocrino y 3) la enfermedad es positiva a receptores hormonales y 4) la enfermedad presenta un mayor riesgo de recurrencia (por ejemplo, edad joven, tumor de alto grado, afectación de ganglios linfáticos).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TREPROSTINIL INJ
Nombres del medicamento	REMODULIN, TREPROSTINIL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevos tratamientos: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	TRIENTINE
Nombres del medicamento	SYPRINE, TRIENTINE HYDROCHLORIDE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TRIKAFTA
Nombres del medicamento	TRIKAFTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para fibrosis quística: El medicamento solicitado no se utilizará en combinación con otros medicamentos que contengan ivacaftor.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TRODELVY
Nombres del medicamento	TRODELVY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma urotelial, el medicamento solicitado será usado como tratamiento subsecuente de cualquiera de los siguientes: a) carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico, b) carcinoma urotelial de vejiga con recidiva local músculo-invasiva o enfermedad persistente en una vejiga preservada, c) carcinoma urotelial de vejiga con recidiva metastásica o local postcistectomía, d) carcinoma primario recurrente de uretra, o e) carcinoma urotelial de vejiga en estadio II-IV. Para cáncer de mama: 1) la enfermedad es recidivante, avanzada o metastásica, Y 2) el medicamento solicitado se utilizará como tratamiento posterior, Y 3) la paciente tiene cáncer de mama triple negativo, o receptor hormonal (HR) positivo, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TRULICITY
Nombres del medicamento	TRULICITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulínico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).

Grupo de autorización previa	TRUQAP
Nombres del medicamento	TRUQAP
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TRUXIMA
Nombres del medicamento	TRUXIMA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Subtipos de linfoma no Hodgkin [linfoma linfocítico pequeño (SLL), linfoma de células del manto, linfomas de zona marginal (linfoma de zona marginal nodal, esplénico, extranodal), linfoma de Burkitt, linfoma cutáneo primario de células B, linfoma de células B de alto grado, transformación histológica de linfomas poco activos a linfoma difuso de células B grandes, transformación histológica de leucemia linfocítica crónica (LLC)/SLL a linfoma difuso de células B grandes, enfermedad de Castleman, linfoma de células B relacionado con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), leucemia de células pilosas, trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTLD), linfoma linfoblástico de células B], púrpura trombocitopénica inmune o idiopática (PTI) refractaria, anemia hemolítica autoinmune, macroglobulinemia de Waldenstrom/linfoma linfoplasmocítico, enfermedad crónica de injerto contra huésped (GVHD), síndrome de Sjogren, púrpura trombótica trombocitopénica, miastenia grave refractaria, linfoma de Hodgkin (linfocito nodular predominante), linfoma primario del sistema nervioso central (CNS), metástasis leptomeníngicas de linfomas, leucemia linfoblástica aguda, prevención de la PTLD relacionada con el virus de Epstein-Barr (EBV), esclerosis múltiple, toxicidades relacionadas con los inhibidores de los puntos de control inmunitarios, pénfigo vulgar, linfomas agresivos pediátricos de células B maduras, enfermedad de Rosai-Dorfman y leucemia aguda pediátrica de células B maduras.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a gravemente activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes requisitos: a) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con metotrexato (MTX), O b) intolerancia o tiene una contraindicación al MTX, Y 2) El paciente cumple CUALQUIERA de los siguientes criterios: a) respuesta inadecuada, intolerancia o tiene una contraindicación al MTX, O b) respuesta inadecuada o intolerancia a un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) biológico previo o a un DMARD sintético específico. Las neoplasias hematológicas deben ser CD20 positivas. Para esclerosis múltiple: 1) el paciente tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple remitente recidivante, Y 2) el paciente ha tenido una respuesta inadecuada a dos o más medicamentos modificadores de la enfermedad indicados para la esclerosis múltiple a pesar de una duración adecuada del tratamiento.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Toxicidades relacionadas con los inhibidores de puntos de control inmunitarios: 3 meses, todos los demás: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TUKYSA
Nombres del medicamento	TUKYSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el cáncer colorrectal (incluido el adenocarcinoma apendicular): 1) el paciente padece una enfermedad avanzada, irsecable o metastásica, Y 2) el paciente padece una enfermedad con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) positivo, Y 3) el paciente padece una enfermedad con RAS no mutado, Y 4) el medicamento solicitado se utilizará en combinación con trastuzumab y 5) el paciente no ha sido tratado previamente con un inhibidor de HER2.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	TURALIO
Nombres del medicamento	TURALIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Erdheim-Chester, enfermedad de Rosai-Dorfman
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para histiocitosis de células de Langerhans: 1) la enfermedad presenta una mutación del receptor del factor estimulante de colonias 1 (CSF1R). Para enfermedad de Erdheim-Chester y enfermedad de Rosai-Dorfman: 1) la enfermedad tiene la mutación CSF1R, Y el paciente tiene cualquiera de los siguientes: a) enfermedad sintomática O b) enfermedad recidivante/refractaria.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TYMLOS
Nombres del medicamento	TYMLOS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de osteoporosis posmenopáusica, la paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) tiene antecedentes de fractura por fragilidad, O 2) una puntuación T previa al tratamiento inferior o igual a -2,5, o una puntuación T previa al tratamiento superior a -2,5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura (FRAX), Y la paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) indicadores de mayor riesgo de fractura (por ejemplo, edad avanzada, fragilidad, tratamiento con glucocorticoides, puntuaciones T muy bajas o mayor riesgo de caídas), O b) la paciente no respondió a un tratamiento previo con un tratamiento inyectable para la osteoporosis o no lo tolera, o c) la paciente ha sido sometida a un ensayo con bifosfonato oral de al menos 1 año de duración o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral. En caso de osteoporosis en hombres: el paciente debe cumplir UNA de las condiciones siguientes: 1) antecedentes de fractura vertebral o de cadera osteoporótica, O 2) puntuación T pretratamiento inferior o igual a -2.5 o puntuación T pretratamiento superior a -2.5 e inferior a -1 con una alta probabilidad de fractura pretratamiento de acuerdo a FRAX, Y el paciente presenta CUALQUIERA de los siguientes: a) el paciente no respondió a un tratamiento inyectable previo para la osteoporosis o no lo tolera, o b) el paciente probó bifosfonatos orales por lo menos durante un 1 año o existe una razón clínica para evitar el tratamiento con un bifosfonato oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	24 meses en total de por vida para los análogos de la hormona paratiroidea.
Otros criterios	El paciente tiene una alta probabilidad de fractura con la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Fractura (FRAX) si la probabilidad a 10 años es mayor o igual al 20 por ciento para cualquier fractura osteoporótica mayor o mayor o igual al 3 por ciento para fractura de cadera. Si el tratamiento con glucocorticoides es superior a 7.5 mg (equivalente de prednisona) al día, la puntuación de riesgo estimada generada con FRAX debe multiplicarse por 1.15 para fractura osteoporótica mayor y por 1.2 para fractura de cadera.

Grupo de autorización previa	TYVASO
Nombres del medicamento	TYVASO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (Organización Mundial de la Salud [OMS] Grupo 1) o hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial (OMS Grupo 3): el diagnóstico se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevos tratamientos: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	TYVASO DPI
Nombres del medicamento	TYVASO DPI MAINTENANCE KI, TYVASO DPI TITRATION KIT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (Organización Mundial de la Salud [OMS] Grupo 1) o hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial (OMS Grupo 3): el diagnóstico se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevos tratamientos: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	TZIELD
Nombres del medicamento	TZIELD
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el retraso de la diabetes tipo 1 (T1D) en estadio 3: 1) el paciente tiene un diagnóstico de T1D en estadio 2 confirmado por los dos criterios siguientes: a) al menos dos autoanticuerpos de células de los islotes pancreáticos positivos Y b) disglucemia sin hiperglucemia manifiesta mediante una prueba oral de tolerancia a la glucosa (OGTT) o método alternativo si procede, Y 2) el historial clínico del paciente no sugiere diabetes tipo 2.
Restricciones de edad	El paciente tiene 8 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo o en consulta con éste.
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	UBRELVY
Nombres del medicamento	UBRELVY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento agudo de migraña: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un triptano agonista de los receptores 5-HT1.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	UCERIS
Nombres del medicamento	BUDESONIDE ER, UCERIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de inducción de la remisión de la colitis ulcerosa activa, de leve a moderada: el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos una terapia con ácido 5-aminosalicílico (5-ASA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	2 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ULTOMIRIS
Nombres del medicamento	ULTOMIRIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH) (inicial): 1) el diagnóstico de PNH se confirmó mediante la detección de una deficiencia de proteínas ancladas a glicosilfosfatidilinositol (GPI-AP) demostrada por: a) al menos un 5% de células PNH o b) al menos un 51% de células polimorfonucleares (PMN) deficientes en GPI-AP Y 2) se utiliza la citometría de flujo para demostrar la deficiencia de GPI-AP. Para PNH (continuación del tratamiento): 1) no hay indicios de toxicidad inaceptable o evolución de la enfermedad mientras esté en el régimen actual Y 2) el paciente ha respondido positivamente al tratamiento (por ejemplo, mejora en los niveles de hemoglobina, normalización de los niveles de lactato deshidrogenasa [LDH]). Para el síndrome urémico hemolítico atípico (SHUa): la enfermedad no está causada por Escherichia coli productora de toxina Shiga.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	PNH, Inicio: 6 meses, todos los demás: Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	UPLIZNA
Nombres del medicamento	UPLIZNA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	UPTRAVI
Nombres del medicamento	UPTRAVI, UPTRAVI TITRATION PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevos tratamientos: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	UZEDY
Nombres del medicamento	UZEDY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Se ha establecido la tolerabilidad con risperidona oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	V- GO
Nombres del medicamento	V-GO 20, V-GO 30, V-GO 40
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Omnipod GO, inicial: 1) El paciente padece diabetes que requiere control con insulina, Y 2) El paciente se mide los niveles de glucosa, el paciente será asesorado sobre el autocontrol de los niveles de glucosa o el paciente utiliza un monitor de glucosa continuo Y 3) el paciente ha experimentado una respuesta inadecuada al tratamiento o intolerancia a un tratamiento con insulina basal de acción prolongada. Omnipod, V-GO, inicial: 1) El paciente padece diabetes que requiere control con insulina con múltiples inyecciones diarias, Y 2) El paciente se mide los niveles de glucosa 4 o más veces al día, O el paciente utiliza un dispositivo de control continuo de glucosa, Y 3) El paciente ha experimentado cualquiera de los siguientes síntomas con el régimen actual de diabetes: control glucémico inadecuado, hipoglucemia recurrente, grandes fluctuaciones de glucosa en sangre, fenómeno del amanecer con hiperglucemia grave persistente en la madrugada, oscilaciones glucémicas graves.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VABYSMO
Nombres del medicamento	VABYSMO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un oftalmólogo u optometrista o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	VALCHLOR
Nombres del medicamento	VALCHLOR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Leucemia/linfoma de células T (LTA) del adulto crónico o latente, micosis fungoide (MF)/síndrome de Sezary (SS) en estadio 2 o superior, linfoma cutáneo primario de la zona marginal, linfoma cutáneo primario del centro folicular, papulosis linfomatoide (PL) CD30-positiva, histiocitosis de células de Langerhans (HCL) unifocal con enfermedad cutánea aislada.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VANFLYTA
Nombres del medicamento	VANFLYTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VARENICLINE TAB
Nombres del medicamento	VARENICLINE STARTING MONT, VARENICLINE TARTRATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa

Nombres del medicamento

Indicador de indicación PA

Usos fuera de lo indicado

Criterios de exclusión

VELCADE

BORTEZOMIB, VELCADE

Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.

Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras, macroglobulinemia de Waldenstrom/linfoma linfoplasmocítico, enfermedad de Castleman multicéntrica, leucemia/linfoma de células T del adulto, leucemia linfoblástica aguda, sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin, síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal, cambios cutáneos).

-
I
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
m
é
d
i
c
a
r
e
q
u
e
r
i
d
a
-
R
e
s
t
r
i
c
c
i
o
n
e
s
d
e

	e
	d
	a
	d
	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	VENCLEXTA
Nombres del medicamento	VENCLEXTA, VENCLEXTA STARTING PACK
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma de células del manto, neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), mieloma múltiple, leucemia mieloide aguda (AML) recidivante o refractaria, macroglobulinemia/linfoma linfoplasmocítico de Waldenstrom, amiloidosis sistémica de cadenas ligeras con translocación t(11:14) recidivante o refractaria, síndrome mielodisplásico
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para leucemia mieloide aguda (AML): 1) el paciente tiene 60 años o más, O 2) el paciente tiene menos de 60 años con genética de riesgo desfavorable y mutación TP53, O 3) el paciente tiene comorbilidades que impiden el uso de quimioterapia de inducción intensiva, O 4) el paciente tiene enfermedad en recaída o refractaria. Para neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides (BPDCN): 1) el paciente tiene una enfermedad sistémica que está siendo tratada con intención paliativa, O 2) el paciente tiene una enfermedad recidivante o refractaria. Para mieloma múltiple: 1) la enfermedad es recidivante o progresiva, Y 2) el medicamento solicitado se utilizará con dexametasona, y 3) el paciente tiene traslocación t(11:14). Para macroglobulinemia de Waldenstrom/linfoma linfoplasmocítico: 1) el paciente tiene una enfermedad tratada previamente que no respondió al tratamiento primario, O 2) el paciente tiene una enfermedad progresiva o recidivante.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VENTAVIS
Nombres del medicamento	VENTAVIS
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de hipertensión arterial pulmonar (Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]): La PAH se confirmó mediante cateterismo cardíaco derecho. Sólo para nuevos tratamientos: 1) la presión arterial pulmonar media pretratamiento es superior a 20 mmHg, Y 2) la presión de enclavamiento capilar pulmonar pretratamiento es inferior o igual a 15 mmHg, Y 3) la resistencia vascular pulmonar pretratamiento es superior o igual a 3 unidades de Wood.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	VEOZAH
Nombres del medicamento	VEOZAH
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VERSACLOZ
Nombres del medicamento	VERSACLOZ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de un paciente gravemente enfermo con esquizofrenia que no ha respondido adecuadamente al tratamiento antipsicótico estándar (es decir, esquizofrenia resistente al tratamiento): 1) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos genéricos: aripiprazol, asenapina, lurasidona, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona, Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los siguientes productos de marca: Caplyta, Rexulti, Secuado, Vraylar.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VERZENIO
Nombres del medicamento	VERZENIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de mama recidivante con receptor hormonal (HR) positivo y con receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo en combinación con fulvestrant o un inhibidor de la aromatasa, o como agente único en caso de evolución con tratamiento endocrino previo y quimioterapia previa en el contexto metastásico.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VIBERZI
Nombres del medicamento	VIBERZI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VICTOZA
Nombres del medicamento	VICTOZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	La Autorización Previa sólo se aplica a los pacientes cuya reclamación no se presente con un código ICD-10 que indique un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 O a los pacientes que no tengan antecedentes de un medicamento antidiabético (EXCLUIDOS los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón [GLP-1 RA] y la combinación de polipéptido insulínico dependiente de la glucosa [GIP] y GLP-1 RA).

Grupo de autorización previa	VIGABATRIN
Nombres del medicamento	SABRIL, VIGABATRIN, VIGADRONE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para las crisis parciales complejas (es decir, crisis de conciencia focal alterada): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento con al menos dos medicamentos antiepilépticos para las crisis parciales complejas (es decir, crisis de conciencia focal alterada).
Restricciones de edad	Espasmos infantiles: de 1 mes a 2 años. Crisis parciales complejas (es decir, crisis de alteración focal de la conciencia): 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VIJOICE
Nombres del medicamento	VIJOICE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VIMIZIM
Nombres del medicamento	VIMIZIM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para mucopolisacaridosis tipo IVA (MPS IVA): El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VITRAKVI
Nombres del medicamento	VITRAKVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Tumores sólidos no metastásicos con fusión del gen neurotrófico tirosina receptor quinasa (NTRK) positivo, tratamiento de primera línea de tumores sólidos con fusión del gen NTRK positivo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para todos los tumores sólidos positivos a la fusión del gen de la tirosina cinasa neurotrófica (NTRK), la enfermedad no presenta una mutación de resistencia adquirida conocida.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VIVJOA
Nombres del medicamento	VIVJOA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	La paciente tiene potencial reproductivo.
Información médica requerida	Para reducir la incidencia de candidiasis vulvovaginal recurrente (RVVC) en una paciente con antecedentes de RVVC: 1) La paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación al fluconazol, Y 2) El medicamento solicitado se utilizará por vía oral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	12 semanas
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VIZIMPRO
Nombres del medicamento	VIZIMPRO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC): 1) la enfermedad es recurrente, avanzada o metastásica Y 2) el paciente es positivo para mutación de EGFR sensibilizante.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VONJO
Nombres del medicamento	VONJO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VORICONAZOLE
Nombres del medicamento	VFEND, VFEND IV, VORICONAZOLE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente utilizará el medicamento solicitado por vía oral o intravenosa.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VOSEVI
Nombres del medicamento	VOSEVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Cirrosis descompensada/deterioro hepático moderado o grave (Child Turcotte Pugh clase B o C).
Información médica requerida	Para hepatitis C: Infección confirmada por la presencia de HCV RNA en suero antes de iniciar el tratamiento. Régimen de tratamiento previsto, genotipo, antecedentes de tratamiento previo, presencia o ausencia de cirrosis (compensada o descompensada [Child Turcotte Pugh clase B o C]), presencia o ausencia de coinfección por HIV, presencia o ausencia de sustituciones asociadas a resistencia cuando proceda, estado del trasplante si procede. Las condiciones de cobertura y la duración específica de la autorización se basarán en las directrices de tratamiento vigentes de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (AASLD-IDSA).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Los criterios se aplican de acuerdo con las directrices actuales de AASLD-IDSA.
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VOTRIENT
Nombres del medicamento	PAZOPANIB HYDROCHLORIDE, VOTRIENT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma de tiroides (folicular, papilar, de células de Hurthle o medular), sarcoma uterino, condrosarcoma, tumor del estroma gastrointestinal
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para carcinoma de células renales: 1) La enfermedad está avanzada, en recaída o en estadio IV, O 2) el medicamento solicitado se utilizará para carcinoma de células renales asociado a von Hippel-Lindau (VHL). Para tumor del estroma gastrointestinal (GIST): el paciente cumple uno de los siguientes criterios: 1) la enfermedad es irreseccable, recurrente/progresiva o metastásica, Y el paciente no ha respondido a un tratamiento aprobado por la FDA (por ejemplo, imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib), 2) el medicamento solicitado se utilizará para GIST no reseccables con deficiencia de succinato deshidrogenasa (SDH), O 3) el medicamento solicitado se utilizará para paliar los síntomas si se ha tolerado previamente y es eficaz. Para sarcoma de partes blandas (STS): El paciente no tiene un sarcoma de partes blandas adipocítico. Para sarcoma uterino: La enfermedad es recurrente o metastásica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VOWST
Nombres del medicamento	VOWST
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de prevención de la recurrencia de la infección por Clostridioides difficile (CDI): 1) El diagnóstico de CDI ha sido confirmado por un análisis de heces positivo para la toxina de C. difficile o C. difficile toxigénico, Y 2) El medicamento solicitado se administrará al menos 48 horas después de la última dosis de antibióticos utilizados para el tratamiento de CDI recurrente.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VOXZOGO
Nombres del medicamento	VOXZOGO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para acondroplasia con epífisis abiertas, inicio: El diagnóstico se confirmó mediante uno de los siguientes: 1) resultados radiológicos de rasgos característicos compatibles con la enfermedad O 2) análisis genéticos. En caso de acondroplasia con epífisis abiertas, continuación del tratamiento: el paciente experimenta una mejoría.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un endocrinólogo, geneticista, neurólogo y especialista en displasia esquelética, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VPRIV
Nombres del medicamento	VPRIV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de enfermedad de Gaucher tipo 1: El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró deficiencia de la actividad enzimática beta-glucocerebrosidasa o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VTAMA
Nombres del medicamento	VTAMA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para psoriasis en placas: el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un corticosteroide tópico, O el paciente tiene una contraindicación que impediría probar un corticosteroide tópico.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VUMERITY
Nombres del medicamento	VUMERITY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VYNDAMAX
Nombres del medicamento	VYNDAMAX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cardiomiopatía de amiloidosis hereditaria o mediada por transtiretina no mutada (ATTR-CM): Inicio: 1) el paciente presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad (por ejemplo, disnea, fatiga, hipotensión ortostática, síncope, edema periférico), Y 2) la afectación cardíaca se confirmó mediante ecocardiografía o resonancia magnética cardíaca (por ejemplo, espesor de la pared del tabique interventricular telediastólico superior a 12 milímetros), Y 3) el paciente cumple uno de los siguientes criterios: a) si la solicitud es para una ATTR-CM hereditaria, el paciente es positivo para una mutación del gen de la transtiretina (TTR); b) si la solicitud es para una ATTR-CM no mutada, el paciente tiene proteínas precursoras de la transtiretina confirmadas mediante análisis. Continuación: la respuesta del paciente demuestra que se ha beneficiado con el tratamiento (por ejemplo, ralentización del deterioro clínico).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VYNDAQEL
Nombres del medicamento	VYNDAQEL
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cardiomiopatía de amiloidosis hereditaria o mediada por transtiretina no mutada (ATTR-CM): Inicio: 1) el paciente presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad (por ejemplo, disnea, fatiga, hipotensión ortostática, síncope, edema periférico), Y 2) la afectación cardíaca se confirmó mediante ecocardiografía o resonancia magnética cardíaca (por ejemplo, espesor de la pared del tabique interventricular telediastólico superior a 12 milímetros), Y 3) el paciente cumple uno de los siguientes criterios: a) si la solicitud es para una ATTR-CM hereditaria, el paciente es positivo para una mutación del gen de la transtiretina (TTR); b) si la solicitud es para una ATTR-CM no mutada, el paciente tiene proteínas precursoras de la transtiretina confirmadas mediante análisis. Continuación: la respuesta del paciente demuestra que se ha beneficiado con el tratamiento (por ejemplo, ralentización del deterioro clínico).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	VYVANSE
Nombres del medicamento	LISDEXAMFETAMINE DIMESYLA, VYVANSE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD) o trastorno por déficit de atención (ADD): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un medicamento genérico estimulante del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, anfetamina, dextroanfetamina, metilfenidato).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	VYVGART
Nombres del medicamento	VYVGART, VYVGART HYTRULO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	WAKIX
Nombres del medicamento	WAKIX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en laboratorio del sueño, Y 2) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento o intolerancia a por lo menos un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo), O tiene una contraindicación que prohibiría probar un medicamento promotor de la vigilia del CNS (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo). Para el tratamiento de la cataplejía en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño. Para continuación del tratamiento: El paciente ha experimentado una disminución de la somnolencia diurna con narcolepsia o una disminución de los episodios de cataplejía con narcolepsia.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en trastornos del sueño o neurólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	WELIREG
Nombres del medicamento	WELIREG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	WINLEVI
Nombres del medicamento	WINLEVI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia, o tiene una contraindicación a un producto alternativo para el acné (por ejemplo, clindamicina tópica, eritromicina tópica, retinoide tópico o isotretinoide oral).
Restricciones de edad	El paciente tiene 12 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XALKORI
Nombres del medicamento	XALKORI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente, NSCLC con amplificación de MET de alto nivel o mutación de omisión del exón 14 de MET, enfermedad de Erdheim-Chester positiva a la fusión de linfoma anaplásico cinasa (ALK) sintomática o en recaída/refractaria, enfermedad de Rosai-Dorfman positiva a la fusión de (ALK) sintomática o en recaída/refractaria, histiocitosis de células de Langerhans positiva a la fusión (ALK).
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC: el medicamento solicitado se utiliza en cualquiera de las siguientes situaciones: 1) el paciente tiene un NSCLC positivo para ALK recurrente, avanzado o metastásico, O 2) el paciente tiene un NSCLC positivo para ROS-1 recurrente, avanzado o metastásico, O 3) el paciente tiene un NSCLC con amplificación de MET de alto nivel o mutación de omisión del exón 14 de MET. En el caso de IMT, la enfermedad es ALK-positiva. En el caso de ALCL, la enfermedad es recidivante o refractaria y ALK positiva.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XDEMZY
Nombres del medicamento	XDEMZY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XELJANZ
Nombres del medicamento	XELJANZ, XELJANZ XR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de artritis reumatoide de moderada a severamente activa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de artritis psoriásica activa (sólo para nuevos tratamientos): 1) el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación para al menos un inhibidor del TNF (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]), Y 2) el medicamento solicitado se utiliza en combinación con un DMARD no biológico. En caso de espondilitis anquilosante activa (sólo para nuevos tratamientos): El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de colitis ulcerosa de moderada a severamente activa (sólo para nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) (por ejemplo, adalimumab-aacf, Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]). En caso de artritis idiopática juvenil poliarticular activa (sólo en nuevos tratamientos): el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) (por ejemplo, adalimumab-aacf, Enbrel [etanercept], Humira [adalimumab], Idacio [adalimumab-aacf]).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XEMBIFY
Nombres del medicamento	XEMBIFY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	XENPOZYME
Nombres del medicamento	XENPOZYME
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para deficiencia de esfingomielinasa ácida (ASMD): El diagnóstico se confirmó mediante análisis enzimático que demostró una deficiencia de la actividad enzimática esfingomielinasa ácida (ASM) o mediante pruebas genéticas.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XEOMIN
Nombres del medicamento	XEOMIN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	Uso cosmético.
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XERMELO
Nombres del medicamento	XERMELO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XGEVA
Nombres del medicamento	XGEVA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipercalcemia de malignidad: la enfermedad es refractaria a un tratamiento intravenoso (IV) con bifosfonatos o existe una razón clínica para evitar un tratamiento IV con bifosfonatos.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	XHANCE
Nombres del medicamento	XHANCE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento con el spray nasal de fluticasona genérico.
Restricciones de edad	El paciente tiene 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XIFAXAN
Nombres del medicamento	XIFAXAN
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica necesaria	Para el síndrome de colon irritable con diarrea (IBS-D): 1) El paciente no ha recibido previamente tratamiento con el medicamento solicitado, O 2) El paciente ha recibido previamente tratamiento con el medicamento solicitado Y a) el paciente está experimentando una recurrencia de los síntomas Y b) el paciente no ha recibido ya un tratamiento inicial de 14 días y dos tratamientos adicionales de 14 días con el medicamento solicitado.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Reducción del riesgo de recidiva de HE manifiesta: 6 meses, IBS-D: 14 días
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XIPERE
Nombres del medicamento	XIPERE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	Recetado por un optometrista u oftalmólogo o en consulta con esos.
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.

Grupo de autorización previa	XOLAIR
Nombres del medicamento	XOLAIR
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para asma persistente de moderado a grave, tratamiento inicial: 1) El paciente tiene una prueba cutánea positiva (o análisis de sangre) de por lo menos un aeroalérgeno perenne, 2) El paciente tiene recuento inicial de IgE mayor o igual a 30 IU/mL, Y 3) el paciente tiene un control inadecuado del asma a pesar del tratamiento actual con ambos de los medicamentos siguientes: a) corticosteroide inhalado de dosis media a alta, Y b) controlador adicional (es decir, agonista beta2 de acción prolongada, antagonista muscarínico de acción prolongada, modificador de leucotrienos o teofilina de liberación sostenida), a menos que el paciente presente intolerancia o tiene una contraindicación a dichos tratamientos. Para asma persistente de moderado a grave, continuación del tratamiento: El control del asma ha mejorado con el tratamiento con el medicamento solicitado, como lo demuestra la reducción de la frecuencia y/o gravedad de los síntomas y exacerbaciones o la reducción de la dosis diaria de corticosteroides orales de mantenimiento. Para urticaria crónica espontánea (CSU), tratamiento inicial: 1) El paciente ha sido evaluado por otras causas de urticaria, incluyendo angioedema relacionado con bradicinina y síndromes urticariales asociados a IL-1 (por ejemplo, trastornos autoinflamatorios, vasculitis urticarial), 2) El paciente ha experimentado una aparición espontánea de habones, angioedema, o ambos, durante al menos 6 semanas, Y 3) El paciente permanece sintomático a pesar del tratamiento con antihistamínicos H1. Para CSU, continuación del tratamiento: El paciente ha experimentado un beneficio (por ejemplo, mejoría de los síntomas) desde el inicio del tratamiento. Para rinosinusitis crónica con poliposis nasal (CRSwNP): 1) El medicamento solicitado se utiliza como tratamiento complementario de mantenimiento, Y 2) El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento con Xhance (fluticasona).
Restricciones de edad	CSU: 12 años de edad o más. Asma: 6 años de edad o más. CRSwNP: 18 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura:	CSU, Inicio: 6 meses, todas las demás: Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XOSPATA
Nombres del medicamento	XOSPATA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y reordenamiento FLT3
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para neoplasias mieloides, linfoides o de linaje mixto con eosinofilia y tirosina quinasa 3 similar al FMS (FLT3): la enfermedad está en fase crónica o blástica.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XPHOZAH
Nombres del medicamento	XPHOZAH
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XPOVIO
Nombres del medicamento	XPOVIO, XPOVIO 60 MG TWICE WEEKLY, XPOVIO 80 MG TWICE WEEKLY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Transformación histológica de linfomas poco activos en linfoma difuso de células B grandes, linfoma de células B relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), linfoma de células B de alto grado
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para mieloma múltiple: El paciente debe haber sido tratado con al menos una terapia previa. Para linfomas de células B: El paciente debe haber sido tratado con al menos dos líneas de tratamiento sistémico.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XTANDI
Nombres del medicamento	XTANDI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración o cáncer de próstata sensible a la castración metastásico: El medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	XYOSTED
Nombres del medicamento	XYOSTED
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, tratamiento inicial: El paciente presentó al menos dos concentraciones séricas de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico, continuación del tratamiento: El paciente presentó una concentración sérica de testosterona total matinal baja confirmada según el intervalo de referencia del laboratorio o las directrices prácticas actuales antes de iniciar el tratamiento con testosterona [Nota: No se ha establecido la seguridad y eficacia de los productos de testosterona en pacientes con "hipogonadismo relacionado con la edad" (también denominado "hipogonadismo de inicio tardío")]. En caso de disforia de género: El paciente puede tomar una decisión informada de someterse a tratamiento hormonal.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XYREM
Nombres del medicamento	SODIUM OXYBATE, XYREM
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño, Y 2) El paciente cumple uno de los siguientes criterios: a) si tiene 17 años o menos, el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un medicamento estimulante del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, anfetamina, dextroanfetamina, metilfenidato), O tiene una contraindicación que le prohibiría probar medicamentos estimulantes del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, anfetamina, dextroanfetamina, metilfenidato), b) Si tiene 18 años o más, el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un medicamento estimulante de la vigilia del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo), O tiene una contraindicación que le prohibiría probar medicamentos estimulantes de la vigilia del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo). Para el tratamiento de la cataplejía en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño. Si la solicitud es para continuar el tratamiento, entonces el paciente experimentó una disminución de la somnolencia diurna con narcolepsia o una disminución de los episodios de cataplexia con narcolepsia.
Restricciones de edad	El paciente tiene 7 años de edad o más
Restricciones del recetador	Recetado por un especialista en trastornos del sueño o neurólogo, o en consulta con ellos
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	XYWAV
Nombres del medicamento	XYWAV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: 1) El diagnóstico se ha confirmado mediante una evaluación en el laboratorio del sueño, Y 2) El paciente cumple uno de los siguientes criterios: a) si tiene 17 años o menos, el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un medicamento estimulante del sistema nervioso central (CNS) (por ejemplo, anfetamina, dextroanfetamina, metilfenidato), O tiene una contraindicación que le prohibiría probar medicamentos estimulantes del sistema nervioso central (por ejemplo, anfetamina, dextroanfetamina, metilfenidato), b) Si tiene 18 años o más, el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un medicamento estimulante de la vigilia del sistema nervioso central (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo), O tiene una contraindicación que le prohibiría probar medicamentos estimulantes de la vigilia del sistema nervioso central (por ejemplo, armodafinilo, modafinilo). En el caso de la hipersomnia idiopática, el diagnóstico ha sido confirmado por TODO lo siguiente: 1) el paciente ha experimentado lapsus de sueño o una necesidad irreprimible de dormir durante el día, diariamente, durante al menos 3 meses, Y 2) se confirma la ausencia del síndrome de sueño insuficiente, Y 3) la cataplejía está ausente, Y 4) menos de 2 períodos de movimientos oculares rápidos al inicio del sueño (SOREMPs) o ningún SOREMPs, si la latencia de los movimientos oculares rápidos en un estudio del sueño nocturno fue menor o igual a 15 minutos, Y 5) latencia media del sueño inferior o igual a 8 minutos en la prueba de latencia múltiple del sueño o el tiempo total de sueño de 24 horas es superior o igual a 11 horas, Y 6) otra afección (trastorno del sueño, trastorno médico o psiquiátrico, o consumo de fármacos/medicamentos) no explica mejor la hipersomnolencia y los resultados de la prueba.
Restricciones de edad	Narcolepsia: 7 años de edad o más, hipersomnia idiopática: 18 años de edad o más
	Restricciones del recetador Recetado por o en consulta con un especialista en trastornos del sueño o neurólogo
	Duración de la cobertura Año del plan
Otros criterios	Para el tratamiento de la cataplejía en un paciente con narcolepsia, solicitud inicial: el diagnóstico ha sido confirmado mediante evaluación del laboratorio del sueño. Para narcolepsia, continuación del tratamiento: el paciente experimentó una disminución de la somnolencia diurna con narcolepsia o una disminución de los episodios de cataplejía con narcolepsia. En caso de hipersomnia idiopática, continuación del tratamiento: el paciente ha experimentado una disminución de la somnolencia diurna con respecto al inicio.

Grupo de autorización previa	YCANTH
Nombres del medicamento	YCANTH
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	YERVOY
Nombres del medicamento	YERVOY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	YONSA
Nombres del medicamento	YONSA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará en combinación con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o tras una orquiectomía bilateral.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZALTRAP
Nombres del medicamento	ZALTRAP
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer colorrectal no resecable.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer colorrectal avanzado, irresecable o metastásico (incluyendo adenocarcinoma apendicular): el medicamento solicitado se utilizará en combinación con FOLFIRI o irinotecan.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZARXIO
Nombres del medicamento	ZARXIO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Neutropenia en síndromes mielodisplásicos (MDS), agranulocitosis, neutropenia en anemia aplásica, neutropenia relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), neutropenia relacionada con trasplante renal, síndrome hematopoyético del síndrome de radiación aguda.
Criterios de exclusión	Uso del producto solicitado dentro de las 24 horas previas o posteriores a la quimioterapia.
Información médica requerida	Para profilaxis o tratamiento de neutropenia febril (FN) inducida por quimioterapia mielosupresora, el paciente debe cumplir los dos criterios siguientes: 1) El paciente tiene un tumor sólido o cáncer no mieloide, y 2) El paciente ha recibido, está recibiendo o recibirá tratamiento mielosupresor contra el cáncer.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZEJULA
Nombres del medicamento	ZEJULA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Liomiosarcoma uterino
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para liomiosarcoma uterino: 1) el paciente ha recibido al menos un tratamiento de segunda línea, Y 2) el paciente tiene enfermedad alterada por BRCA.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZELBORAF
Nombres del medicamento	ZELBORAF
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico, leucemia de células pilosas, carcinoma de tiroides (es decir, carcinoma papilar, carcinoma folicular y carcinoma de células de Hurthle), cáncer del sistema nervioso central (es decir, glioma, astrocitoma, glioblastoma, glioma pediátrico difuso de alto grado), tratamiento sistémico complementario para melanoma cutáneo, histiocitosis de células de Langerhans.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer del sistema nervioso central (CNS) (es decir, glioma, astrocitoma, glioblastoma, glioma difuso de alto grado pediátrico): 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) El medicamento solicitado se utilizará en combinación con cobimetinib, O el medicamento solicitado se está utilizando para el tratamiento de un glioma difuso de alto grado en paciente pediátrico. Para el melanoma: 1) El tumor es positivo para la mutación activadora BRAF V600 (por ejemplo, V600E o V600K), Y 2) El medicamento solicitado se utilizará como agente único o en combinación con cobimetinib, Y 3) El medicamento solicitado se utilizará para cualquiera de los siguientes casos: a) enfermedad irreseccable, reseccable limitada o metastásica, b) tratamiento sistémico complementario. Para enfermedad de Erdheim-Chester e histiocitosis de células de Langerhans: El tumor es positivo para mutación BRAF V600. Para carcinoma pulmonar no microcítico: 1) El tumor es positivo para la mutación BRAF V600E, Y 2) El paciente tiene enfermedad recurrente, avanzada o metastásica. En caso de carcinoma tiroideo papilar, folicular y de células de Hurthle: 1) El tumor es positivo para mutación BRAF, Y 2) La enfermedad no es susceptible a tratamiento con yodo radiactivo (RAI).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZEPOSIA
Nombres del medicamento	ZEPOSIA, ZEPOSIA 7-DAY STARTER PAC, ZEPOSIA STARTER KIT
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para colitis ulcerosa de moderada a muy activa (sólo para nuevos tratamientos): El paciente ha presentado una respuesta inadecuada al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a por lo menos un tratamiento convencional (por ejemplo, corticosteroides).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZEPZELCA
Nombres del medicamento	ZEPZELCA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Cáncer de pulmón microcítico recidivante, cáncer de pulmón microcítico primario progresivo.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para cáncer de pulmón microcítico: el medicamento solicitado se utilizará como agente único en uno de los siguientes escenarios: 1) la enfermedad ha recaído tras una respuesta completa o parcial o una enfermedad estable con el tratamiento inicial, 2) el paciente tiene una enfermedad primaria progresiva, o 3) el paciente tiene una enfermedad metastásica tras la evolución de la enfermedad en o después de la quimioterapia basada en platino.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZIEXTENZO
Nombres del medicamento	ZIEXTENZO
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos no indicados	Indicaciones relacionadas con el trasplante de células madre
Criterios de exclusión	Uso del producto solicitado dentro de las 24 horas previas o posteriores a la quimioterapia.
Información médica requerida	Para la profilaxis de la neutropenia febril inducida por quimioterapia mielosupresora, el paciente debe cumplir los dos criterios siguientes: 1) El paciente tiene un tumor sólido o cáncer no mielóide, y 2) El paciente está recibiendo o recibirá tratamiento mielosupresor contra el cáncer.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	6 meses
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZILXI
Nombres del medicamento	ZILXI
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a un metronidazole genérico tópico o al ácido azelaico tópico 15%
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZIRABEV
Nombres del medicamento	ZIRABEV
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Adenocarcinoma ampular, cáncer de mama, cánceres del sistema nervioso central (CNS), mesotelioma pleural maligno, mesotelioma peritoneal maligno, mesotelioma pericárdico, mesotelioma de túnica vaginal del testículo, sarcomas de partes blandas, neoplasias uterinas, carcinoma endometrial, cánceres vulvares, adenocarcinoma del intestino delgado y trastornos relacionados con la oftalmología: edema macular diabético, degeneración macular neovascular (húmeda) asociada a la edad, incluidos los subtipos de coroidopatía polipoidea y proliferación angiomasosa retiniana, edema macular tras oclusión de la vena retiniana, retinopatía diabética proliferativa, neovascularización coroidea, glaucoma neovascular y retinopatía del prematuro.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	Se denegará la cobertura bajo la Parte D si la cobertura está disponible por la Parte A o la Parte B, ya que el medicamento se receta y dispensa o administra para el individuo.
Grupo de autorización previa	ZOLADEX
Nombres del medicamento	ZOLADEX
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Disforia de género, tratamiento de sangrado uterino anovulatoria crónico (CAUB) con anemia grave
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En el caso del cáncer de mama, el medicamento solicitado se utiliza para enfermedad positiva para receptor hormonal (HR). Para disforia de género (GD), el paciente debe cumplir uno de los siguientes criterios: 1) el paciente está experimentando una transición de género y recibirá el medicamento solicitado junto con hormonas de reafirmación de género, o 2) el medicamento solicitado se utilizará para la supresión hormonal puberal y el paciente ha alcanzado el estadio 2 de pubertad de Tanner o superior.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Agente adelgazante del endometrio antes de la ablación: 3 meses, Endometriosis, CAUB: 6 meses, Otros: año del plan.
Otros criterios	La dosis de 10.8 mg no está aprobada para diagnósticos distintos del cáncer de mama o de próstata.

Grupo de autorización previa	ZOLINZA
Nombres del medicamento	ZOLINZA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Micosis fungoide (MF), síndrome de Sezary (SS)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZOLPIDEM
Nombres del medicamento	ZOLPIDEM TARTRATE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para insomnio: El paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia al zolpidem comprimidos de liberación inmediata.
Restricciones de edad	Menos de 65 años de edad
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZONISADE
Nombres del medicamento	ZONISADE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para el tratamiento complementario de convulsiones de inicio parcial (es decir, convulsiones de inicio focal): 1) El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una contraindicación a uno de los anticonvulsivos genéricos Y El paciente respondió inadecuadamente al tratamiento, presenta intolerancia o tiene una de las siguientes contraindicaciones: Aptiom, Xcopri, Spritam O 2) El paciente tiene dificultad para tragar formas farmacéuticas orales sólidas (por ejemplo, comprimidos, cápsulas).
Restricciones de edad	El paciente tiene 16 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZORYVE
Nombres del medicamento	ZORYVE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para psoriasis en placas: el paciente ha respondido inadecuadamente al tratamiento o presenta intolerancia a por lo menos un corticosteroide tópico, O el paciente tiene una contraindicación que impediría probar un corticosteroide tópico.
Restricciones de edad	El paciente tiene 6 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZORYVE FOAM
Nombres del medicamento	ZORYVE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de dermatitis seborreica: si el paciente tiene 12 años o más, si el paciente ha presentado una respuesta inadecuada al tratamiento, intolerancia o tiene una contraindicación al ketoconazole tópico.
Restricciones de edad	El paciente tiene 9 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZTALMY
Nombres del medicamento	ZTALMY
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	-
Restricciones de edad	El paciente tiene 2 años de edad o más
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZURZUVAE
Nombres del medicamento	ZURZUVAE
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	En caso de tratamiento de depresión posparto (PPD): el diagnóstico se confirmó usando escalas de medición estandarizadas que miden de manera fiable los síntomas de la depresión (por ejemplo, Hamilton Depression Rating Scale [HDRS], Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS], Patient Health Questionnaire 9 [PHQ9], Montgomery-Asberg Depression Rating Scale [MADRS], Beck's Depression Inventory [BDI], etc.).
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	1 mes
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZYDELIG
Nombres del medicamento	ZYDELIG
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfoma linfocítico pequeño (SLL)
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para CLL/SLL: el medicamento solicitado se utiliza como tratamiento de segunda línea o posterior
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-
Grupo de autorización previa	ZYKADIA
Nombres del medicamento	ZYKADIA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC) recurrente ALK-positivo, NSCLC ROS1-positivo recurrente, avanzado o metastásico, tumor miofibroblástico inflamatorio (IMT), metástasis cerebrales de NSCLC.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	Para NSCLC: el paciente tiene enfermedad recurrente, avanzada o metastásica ALK-positivo o ROS1-positivo. En el caso de tumor miofibroblástico inflamatorio: la enfermedad es ALK-positiva. Para metástasis cerebrales de NSCLC: el paciente tiene NSCLC ALK-positivo.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZYNLONTA
Nombres del medicamento	ZYNLONTA
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA; algunas indicaciones médicamente aceptadas.
Usos fuera de lo indicado	Linfomas de células B relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (linfoma difuso de células B grandes relacionado con el SIDA, linfoma de efusión primaria y linfoma difuso de células B grandes positivo al herpesvirus humano 8 (HHV8), no especificado de otra forma) y transformación histológica de linfomas poco activos a linfoma difuso de células B grandes.
Criterios de exclusión	-
Información médica requerida	El medicamento solicitado se utilizará como tratamiento de segunda línea o posterior.
Restricciones de edad	-
Restricciones del recetador	-
Duración de la cobertura	Año del plan
Otros criterios	-

Grupo de autorización previa	ZYNYZ
Nombres del medicamento	ZYNYZ
Indicador de indicación PA	Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.
Usos fuera de lo indicado	-
Criterios de exclusión	-

**I
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
m
é
d
i
c
a
r
e
q
u
e
r
i
d
a
-
R**

**e
s
t
r
i
c
c
i
o
n
e
s
d
e
e
d
a
d**

Restricciones del recetador

-

Duración de la cobertura

Año del plan

Otros criterios

-

Grupo de autorización previa

ZYPREXA RELPREVV

Nombres del medicamento

ZYPREXA RELPREVV

Indicador de indicación PA

Todas las indicaciones aprobadas por la FDA.

Usos fuera de lo indicado

-

Criterios de exclusión

-

Información médica requerida

Se ha establecido la tolerabilidad con olanzapina oral.

Restricciones de edad

-

Restricciones del recetador

-

Duración de la cobertura

Año del plan

Otros criterios

-